

ASPAVELI® kan øke risikoen for alvorlige og livstruende infeksjoner. Alvorlige infeksjoner kan raskt bli livstruende og føre til død hvis de ikke oppdages og behandles tidlig. Dersom du får noen av følgende tegn og symptomer på en alvorlig infeksjon, må du umiddelbart ringe legen eller få akutt helsehjelp:

- hodepine og feber
- feber og utslett
- feber med eller uten skjelvetokter eller frysninger
- kortpustethet
- kraftig hjertebank
- klam hud
  
- hodepine med stiv nakke eller stiv rygg
- hodepine med kvalme eller oppkast
- øynene blir sensitive overfor lys
- muskelsmerter med influensalignende symptomer
- forvirring
- ekstrem smerte eller ubehag

**Ha alltid kortet med deg** når du er under behandling og i 2 måneder etter siste dose. Det er en risiko for alvorlige infeksjoner i flere uker etter den siste dosen.

**Vis kortet til alt helsepersonell som behandler deg.**

---

Pasientens navn

---

Referansenummer for kontrollert distribusjon

---

Forskrivers navn

---

Forskrivers telefonnummer

# ASPAVELI (pegcetakoplan) ▲



**HA ALLTID DETTE KORTET MED DEG  
VIS DET TIL HELSEPERSONELL SOM BEHANDLER  
DEG, OG HVIS DU KOMMER PÅ SYKEHUS**



**Erklæring om konfidensialitet og personvern**  
All informasjon du oppgir blir håndtert i henhold til Sobis retningslinjer for personvern og i samsvar med formålene som er oppgitt. Hvis du vil ha fullstendig informasjon om hvordan personopplysninger beskyttes av Sobi, kan du lese retningslinjene våre her: <https://sobi.no/personvern>. Hvis du ikke samtykker med denne bruken av opplysningene dine, må du kontakte oss via kontaklinformasjonen på nettsiden.

## INFORMASJON TIL BEHANDLENDE LEGE

Denne pasienten har fått forskrevet ASPAVELI® (pegcetakoplan) som øker pasientens risiko for alvorlige bakterielle infeksjoner, for eksempel *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* og *Haemophilus influenzae* type B.

- Alvorlige bakterielle infeksjoner kan raskt bli livstruende eller dødelige hvis de ikke oppdages og behandles tidlig.
- Overvåk pasienten nøye for å oppdage tidlige tegn og symptomer på alvorlig infeksjon, og evaluer øyeblikkelig hvis det er mistanke om infeksjon. Behandle kjente infeksjoner omgående.
- Kontakt pasientens behandlende lege så raskt som mulig hvis det er mistanke om alvorlig infeksjon.

Se fullstendig preparatomtale for mer informasjon om ASPAVELI®. Oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmateriell finnes på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no).

Helsepersonell bes melde nye, uventede og alvorlige mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding).

Pasienter som får ASPAVELI® skal alltid ha med seg dette kortet. Pasienter må vise referansenummeret for kontrollert distribusjon på apoteket før ASPAVELI® kan utleveres.