



## Sjekkliste for voksne 2: Sjekkliste for løpende oppfølgingen av lisdeksamfetamindimesilat-behandling (Balidax)

Denne sjekklisten er utformet for å støtte deg i løpende oppfølging av lisdeksamfetamindimesilat-behandling hos voksne pasienter med attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Som beskrevet i detalj i preparatomtalen og i produktets forskrivningsinformasjon, skal vekt, psykiatrisk og kardiovaskulær status overvåkes regelmessig hos pasienter som tar lisdeksamfetamindimesilat.

Det anbefales at denne sjekklisten brukes sammen med Balidax preparatomtale ([www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no)). Viktigst:

- Blodtrykk (**bruk av kategorier definert av American Heart Association i tabell 1, nedenfor**) og hjertefrekvens (puls) skal registreres i et prosentilskjema ved hver dosejustering og deretter minst hver sjettede måned.

- Tabell 1. Blodtrykkskategorier definert av American Heart Association.

Blodtrykkskategori	Systolisk mm Hg (øvre verdi)		Diastolisk mm Hg (nedre verdi)
Normalt	lavere enn 120	og	lavere enn 80
Prehypertensjon	120 – 139	eller	80 – 89
Høyt blodtrykk (Hypertensjon) stadium 1	140 – 159	eller	90 – 99
Høyt blodtrykk (Hypertensjon) stadium 2	160 eller høyere	eller	100 eller høyere
Hypertensiv krise (akutt hjelp nødvendig)	Høyere enn 180	eller	Høyere enn 110

- Vekt skal noteres og overvåkes i løpet av behandlingen
- Utvikling av nye eller forverring av eksisterende psykiske lidelser bør følges opp ved hver dosejustering og deretter minst hver sjettede måned og ved hvert besøk
- Pasientene skal også overvåkes for risiko for videreformidling, feilbruk og misbruk av lisdeksamfetamindimesilat

Leger som velger å forskrive lisdeksamfetamindimesilat over lengre perioder (over 12 måneder) bør vurdere effektiviteten av lisdeksamfetamindimesilat på nytt minst en gang i året, med prøveperioder uten medisinerings for å vurdere pasientens funksjonsevne uten medisinerings. Vennligst se Balidax preparatomtale for flere detaljer.

Vennligst last ned og skriv ut dette diagrammet før konsultasjon. Den ferdige sjekklisten kan dokumenteres i pasientjournalen.

Mens du arbeider deg gjennom sjekklisten kan det være nyttig å referere tilbake til: "Balidax Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren" sammen med pasienten (via [www.legemiddelsok.no](http://www.legemiddelsok.no)).

### Løpende oppfølging av lisdeksamfetamindimesilat-behandling

Dato for innledende vurdering:	
Pasientens navn:	
Fødselsdato:	
Alder:	Kjønn:

Gå nøye gjennom følgende systemer som angitt nedenfor, ved hver dosejustering og ved hvert oppfølgingsbesøk (minst hver sjettede måned):

	<b>Evaluert</b>
Generelle medisinske funn	



- Dokumenter endringer i kroppsvekt på eget diagram for løpende oppfølging (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.4)</b> - <b>Langtidseffekt på vekt</b>	<input type="checkbox"/>
- Pasienten har betydelig vekttap o <b>Vurder avbrudd av lisdexamfetamindimesilat-behandlingen</b>	<input type="checkbox"/>
- Dokumenter eventuell indikasjon på viderefremidling, feilbruk eller misbruk av lisdexamfetamindimesilat (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.4 – Misbruk og avhengighet</b> )	<input type="checkbox"/>
- Dokumenter eventuell indikasjon på avhengighet av eller toleranse overfor lisdexamfetamindimesilat (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.4 – Misbruk og avhengighet</b> )	<input type="checkbox"/>
- Kvinnelige pasienter (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.6 – Fertilitet, graviditet og amming</b> ) o <b>Legen bør diskutere lisdexamfetamindimesilat-behandling med kvinnelige pasienter som har startet menstruasjon</b>	<input type="checkbox"/>
- Graviditet (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.6 – Graviditet</b> ) o <b>Vurder nytte/risiko</b> (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.6 – Graviditet</b> )	<input type="checkbox"/>
- Amming (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.6 – Amming</b> ) o <b>Balidax skal ikke brukes under amming</b>	<input type="checkbox"/>
- Nedsatt nyrefunksjon (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.2 – Pasienter med nedsatt nyreleverfunksjon</b> ) o <b>Som følge av redusert clearance hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR 15 til &lt; 30 ml/minutt/1,73 m<sup>2</sup> eller CrCl &lt; 30 ml/minutt) bør maksimaldosen ikke overskride 50 mg/døgn</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Nye kardiovaskulære funn eller forverring av disse (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.4 – Kardiovaskulære bivirkninger</b>)</b>	
- Anstrengelsesutløste brystmerter o Referer til rask kardial evaluering av spesialist dersom noen av de ovennevnte symptomene er tilstede	<input type="checkbox"/>
- Uforklarlig synkope o Referer til rask kardial evaluering av spesialist dersom noen av de ovennevnte symptomene er tilstede	<input type="checkbox"/>
- Andre symptomer som kan tyde på hjertesykdom o Referer til rask kardial evaluering av spesialist dersom noen av de ovennevnte symptomene er tilstede	<input type="checkbox"/>
- Dokumenter blodtrykk og hjerterefrekvens (puls) på separat <b>diagram for løpende oppfølging</b>	<input type="checkbox"/>
- Endringer i blodtrykk og hjerterefrekvens (puls)	<input type="checkbox"/>

<b>Nye nevrologiske og psykiatriske funn eller forverring av disse (se <b>Balidax preparatomtale avsnitt 4.4 –Advarsler og forsiktighetsregler</b>)</b>	
- Utvikling av nye psykotiske eller maniske symptomer (for eksempel hallusinasjoner, vrangforestillinger eller manier)	<input type="checkbox"/>
- Forverring av symptomer på atferdforstyrrelse og tankeforstyrrelse hos pasienter med eksisterende psykotiske lidelser	<input type="checkbox"/>
- Aggressiv atferd eller fiendtlighet	<input type="checkbox"/>
- Nyoppstått eller forverring av anfall	<input type="checkbox"/>
- Uklart syn eller tilpasningsvanskeligheter	<input type="checkbox"/>
<b>Behandlingsvarighet</b>	
- Lisdexamfetamindimesilat brukt i over 12 måneder <b>Revurder nytten av lisdexamfetamindimesilat og vurder prøveperioder uten medisiner</b>	<input type="checkbox"/>
Behandlingen med lisdexamfetamindimesilat må avbrytes hvis symptomene ikke bedres etter dosejustering over en 1-måneders periode. Dersom paradoksal forverring av symptomene eller andre	<input type="checkbox"/>

