

# baqsimi<sup>®</sup>

(glukagon) nesepulver 3mg



## RIKTIG BRUK AV BAQSIMI NESEPULVER

---

### INDIKASJON

BAQSIMI<sup>®</sup> er indisert til behandling av alvorlig lavt blodsukker (hypoglykemi) hos voksne, ungdom og barn 4 år og eldre med diabetes mellitus.

Les også pakningsvedlegget og bruksanvisningen som medfølger BAQSIMI.

Disse kan du søke opp på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no).

## HVA ER BAQSIMI

- BAQSIMI er en form av glukagon som administreres som et puff i nesen. Det har motsatt virkning av insulin og øker blodsukkeret.
- BAQSIMI er klar til bruk skal ikke blandes eller tilpasses. Dosen er forhåndsinnstilt.
- BAQSIMI trenger ikke å bli inhalert. **Baqsimi gis i tilfeller med alvorlig lavt blodsukker, selv om du er bevisstløs, nesen din er tett eller du har brukt slimhinneavsvellende legemidler.**
- BAQSIMI trenger ikke å bli oppbevart i kjøleskap. Det skal oppbevares ved høyst 30°C.

## NÅR BRUKES BAQSIMI

- BAQSIMI brukes når noen har et tilfelle med alvorlig lavt blodsukker, hvor personen er ute av stand til å spise eller drikke, og trenger hjelp fra andre.
- Det er viktig at personer rundt deg kjenner igjen mulige tegn på alvorlig lavt blodsukker, slik at de kan være forberedt og skikket til å hjelpe.

Mulige tegn på alvorlig lavt blodsukker inkluderer:

- Svimmelhet
- Uoppmerksomhet eller forvirring
- Kramper eller tap av bevissthet
- Humørsvingninger
- Tap av koordinasjon
- Skjelving eller svetting

# HVORDAN BRUKE BAQSIMI

## Les bruksanvisningen før bruk av BAQSIMI

- Vis dine familiemedlemmer og venner hvor du oppbevarer BAQSIMI, og forklar hvordan det brukes. **De skal kjenne til hvordan det brukes før du trenger det.**
- **Ikke** fjern plastforseglingen eller åpne røret før du er klar til å gi dosen. Om røret har vært åpnet, kan endosebeholderen ha blitt utsatt for fuktighet. Dette kan føre til at legemidlet ikke virker som forventet.
- **Ikke** trykk ned stemplet før dosen er klar til å gis. Enkeltdosen i endosebeholderen vil da gå tapt.
- Bruk ikke BAQSIMI etter utløpsdatoen som er angitt på esken, røret og endosebeholderen.

## Forbered dosen umiddelbart før bruk:

- Fjern plastforseglingen ved å dra i den røde stripen.
- Åpne lokket og ta endosebeholderen ut av røret.



Oppbevar BAQSIMI i det forseglede røret frem til den skal brukes.

## Hvordan gi Baqsimi



- **HOLD** endosebeholderen som anvist. **Ikke trykk på stemplet før innføring i nesen.**



- **INNFØR** tuppen forsiktig i ett av neseborene inntil fingeren berører utsiden av nesen.



- **TRYKK** stemplet helt inn med tommelen **til den grønne linjen på stemplet ikke lenger er synlig.**

### Etter at dosen er gitt:

Dersom personen er bevisstløs skal personen legges i sideleie etter at BAQSIMI er gitt.

#### **Kontakt medisinsk hjelp umiddelbart.**

Forsøk å få personen med lavt blodsukker til å spise eller drikke noe sukkerholdig, som søtsaker eller fruktjuice, så fort som mulig.

#### **Kast den brukte beholderen og røret.**

BAQSIMI® er et varemerke eid eller lisensiert av Amphastar dets datterselskap eller tilknyttede.

Amphastar France Pharmaceuticals  
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte,  
Frankrike



01-512-01-NO 02.24

© 2024 Amphastar

Alle rettigheter forbeholdt.