

## Pasientkort

Dabigatran Etexilate Zentiva kapsler

dabigatranetexilat

- Du/omsorgspersonen må alltid ha med seg dette kortet
- Forsikre deg om at du bruker nyeste versjon

### **Kjære pasient/omsorgsperson for et barn**

Din/barnets lege har startet behandling med Dabigatran Etexilate Zentiva. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye slik at du bruker Dabigatran Etexilate Zentiva på en sikker måte.

Da dette pasientkortet inneholder viktig informasjon om din/barnets behandling, er det viktig at du/barnet alltid har kortet med for å informere helsepersonell om at du/barnet bruker Dabigatran Etexilate Zentiva.

### **Informasjon om Dabigatran Etexilate Zentiva til pasienter/omsorgspersoner for barn**

Om din/barnets behandling

- Dabigatran Etexilate Zentiva fortynner blodet. Det brukes til å behandle eksisterende blodpropper eller forhindre dannelsen av farlige blodpropper.
- Bruk alltid Dabigatran Etexilate Zentiva nøyaktig slik din/barnets lege har forklart deg. Du må aldri hoppe over en dose eller avbryte behandling med Dabigatran Etexilate Zentiva uten først å rådføre deg med din/barnets lege.
- Informer din/barnets lege om alle andre legemidler du/barnet bruker.
- Informer din/barnets lege om at du bruker Dabigatran Etexilate Zentiva før eventuelle kirurgiske inngrep/invasive prosedyrer.
- Dabigatran Etexilate Zentiva kan tas med eller uten mat. Kapslene skal svelges hele med et glass vann. Kapslen må ikke knuses, tygges eller innholdet tømmes ut av kapselen.

Når du skal søke medisinsk hjelp

- Inntak av Dabigatran Etexilate Zentiva kan øke blødningsrisikoen. Snakk med din/barnets lege umiddelbart hvis du/barnet opplever tegn og symptomer på blødning, for eksempel: hevelse, ubehag, uvanlig smerte eller hodepine, svimmelhet, blekhet, svakhet, uvanlig dannelse av blåmerker, neseblødning, bløning i tannkjøtt, uvanlig langvarig blødning fra kutt, unormal menstruasjonsblødning eller vaginal blødning, blod i urinen som kan være

rosa eller brunt, rød/sort avføring, opphosting av blod, oppkast av blod eller kaffegrutlignende stoff.

- Ved fall eller sakder, spesielt slag mot hodet, må det umiddelbart søkes legehjelp.
- Du må ikke avbryte behandling med Dabigatran Etxilate Zentiva uten først å rådføre deg med din/barnets lege, hvis du/barnet opplever halsbrann, kvalme, oppkast, ubehag i magen, føler deg oppblåst eller får smerte i øvre mageregion.

### **Informasjon om Dabigatran Etxilate Zentiva til helsepersonell**

- Dabigatran Etxilate Zentiva er et oralt antikoagulantium (direkte trombinhemmer).
- Dabigatran Etxilate Zentiva må kanskje seponeres før kirurgiske inngrep eller andre invasive prosedyrer.
- Ved større blødninger må Dabigatran Etxilate Zentiva seponeres umiddelbart
- Et spesifikt reverserende middel (idarusizumab) er tilgjengelig for voksne pasienter. Effekt og sikkerhet av det reverserende midlet idarusizumab har ikke blitt fastslått hos barn. Se preparatomtalene for Dabigatran Etxilate Zentiva og idarusizumab for detaljer og flere råd for å motvirke den koagulasjonshemmende virkningen av Dabigatran Etxilate Zentiva.
- Dabigatran Etxilate Zentiva skilles hovedsakelig ut gjennom nyrene, adekvat diurese må opprettholdes. Dabigatran Etxilate Zentiva kan fjernes ved dialyse.

**Fyll ut informasjonen nedenfor eller be din/barnets lege om å gjøre det.**

### **Pasientinformasjon**

Pasientens navn
Fødselsdato
Indikasjon for antikoagulasjon
Dose av Dabigatran Etxilate Zentiva