



## DRONEDARONE TEVA VEILEDNING FOR FORSKRIVERE

### Denne veiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon for sikker bruk av dronedaron (Dronedarone Teva)

#### Hensikten med veiledningen er:

Å gi forskrivere av Dronedarone Teva (dronedaron) veiledning om:

1. screening av pasientene før oppstart av behandling
2. kontroll av pasientene under behandling
3. seponering av Dronedarone Teva dersom det blir nødvendig
4. å gi pasientene råd om bruken

Dette kommer i tillegg til preparatomtalen (SPC) og pakningsvedlegget.

Veiledningen inneholder derfor ikke fullstendig forskrivningsinformasjon.

Oppdatert preparatomtale kan søkes opp på Legemiddelsøk på [www.legemiddelverket.no](http://www.legemiddelverket.no).

#### Sikkerbruk:

- Behandling med Dronedarone Teva skal kun:
  - startes og følges opp under veiledning av spesialist
  - forskrives etter at alternative behandlingsmuligheter har blitt vurdert
- Behandling med Dronedarone Teva kan startes opp poliklinisk.

## Før behandlingsstart

Ikke forskriv Dronedarone Teva dersom **noen** av "ja"-kriteriene (**røde knapper**) gjelder. Du bør bare forskrive Dronedarone Teva hvis **alle** "nei"-kriteriene (**grønne knapper**) gjelder. Kontraindikasjoner bør bekreftes med EKG, serumkreatinin og lever-og lungeprøver.

Dronedarone Teva er indisert for vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persisterende atrieflimmer (AF)

## Kontroller under behandling

Følgende vurderinger anbefales under behandling med Dronedarone Teva. Kriterier for seponering er også beskrevet. Dersom **noen** av "ja"-kriteriene (**røde knapper**) skulle oppstå under behandling, skal Dronedarone Teva seponeres.

## Pasientrådgivning

Pasientene bør bli informert om at under behandling med Dronedarone Teva vil blodprøver og EKG bli utført, og bør rådes til:

