



Sjekkliste for forskriver

Instruksjoner: Fullfør sjekkliste ved hvert besøk og arkiver i pasientens journal.

Pasientens initialer: Født: Kjønn: M K Alder:

Jeg har fullført følgende før jeg forskriver Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan for en pre-eksposisjonell profylakse (PrEP) indikasjon for pasienten som skal starte, eller er under behandling, med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan for en PrEP indikasjon:

Initiell Evaluering

<input type="checkbox"/>	Fullført risikoevaluering av ikke-infisert pasient
<input type="checkbox"/>	Bekreftet negativ HIV-1-test rett før initiering av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil for en PrEP-indikasjon ved bruk av en kombinert antigen/antistoff-test <ul style="list-style-type: none"> • Hvis kliniske symptomer forenlig med akutt virusinfeksjon er tilstede og det er mistanke om nylig (<1 måned) eksponering, utsett start av PrEP i minst 1 måned og bekreft HIV-1-status på nytt.
<input type="checkbox"/>	Utførte screening for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), som syfilis og gonorré
<input type="checkbox"/>	Hvis aktuelt, evaluert risiko/fordel for kvinner som kan være gravide eller kanskje ønsker å bli gravide
<input type="checkbox"/>	Utført HBV-screeningstest
<input type="checkbox"/>	Tilbudt HBV-vaksinasjon etter behov
<input type="checkbox"/>	Bekreftet estimert kreatininclearance (CrCl) før oppstart <p>Ikke-infiserte voksne CrCl >80 mL/min. Dersom CrCl <80 mL/min, brukes kun hvis fordelene oppveier risikoen. Anbefales ikke hvis CrCl <60 mL/min.</p> <p>Ikke-infiserte ungdom Bør ikke brukes hvis CrCl <90 mL/min/1.73 m².</p>
<input type="checkbox"/>	Bekreftet at pasienten i risikogruppen ikke tar andre HIV-1- eller HBV-medisiner
<input type="checkbox"/>	Bekreftet at personen i risikogruppen ikke tar eller nylig har tatt et nefrotoksisk legemiddel <p>Hvis samtidig bruk av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil og nefrotoksiske midler er uunngåelig, bør nyrefunksjonen overvåkes ukentlig.</p>

Rådgivning

<input type="checkbox"/>	Forklar at Emtricitabine/Tenofovir disoproxil for en PrEP-indikasjon kun bør brukes som en del av en omfattende forebyggingsstrategi, gi opplæring i det å praktisere sikrere sex konsekvent og bruke kondomer riktig
<input type="checkbox"/>	Veiled om viktigheten av å følge det daglige doseringsregime
<input type="checkbox"/>	Anbefal å legge til en påminnelse på mobiltelefonen eller annen enhet som kan varsle dem når det er på tide å ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

<input type="checkbox"/>	Diskuter viktigheten av at pasienten kjenner sin HIV-1-status og, hvis mulig, statusen til partneren(e)
<input type="checkbox"/>	Forklar viktigheten av planlagt oppfølging, inkludert regelmessige HIV-1 screeningstester (f.eks. minst hver 3. måned), mens de tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil for en PrEP-indikasjon for å bekrefte HIV-1-negativ status
<input type="checkbox"/>	Diskuter viktigheten av å seponere Emtricitabine/Tenofovir disoproxil for en PrEP-indikasjon hvis serokonversjon har skjedd, for å redusere utviklingen av resistente HIV-1-varianter
<input type="checkbox"/>	Forklar viktigheten av screening for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), som syfilis og gonoré, som kan lette overføring av HIV-1
<input type="checkbox"/>	Veiled om kjente sikkerhetsrisikoer ved bruk av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil for en PrEP-indikasjon
<input type="checkbox"/>	Utlever pasientmateriale til pasienten og gjennomgå dette med de

Oppfølging

<input type="checkbox"/>	Utført regelmessig HIV-1-screening (f.eks. minst hver 3. måned)
<input type="checkbox"/>	Sjekket pasientens rapporterte overholdelse (f.eks. fra kalenderen på påminnelseskortet)
<input type="checkbox"/>	Reevaluert pasienten ved hvert besøk for å finne ut om de fortsatt har høy risiko for HIV-1-infeksjon. Risikoen for HIV-1-infeksjon bør balanseres mot potensialet for nyre- og skjeletteffekter ved langvarig bruk av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil
<input type="checkbox"/>	Seponert Emtricitabine/Tenofovir disoproxil for PrEP hvis serokonversjon har forekommet
<input type="checkbox"/>	Utført screening for kjønnssykdommer, som syfilis og gonoré
<input type="checkbox"/>	Identifisert potensielle bivirkninger
<input type="checkbox"/>	<p>Utført nyremonitorering som anbefalt</p> <p>Hos pasienter uten nyrerisikofaktorer bør nyrefunksjonen (kreatininclearance og serumfosfat) overvåkes etter 2 til 4 ukers bruk, etter 3 måneders bruk og hver 3. til 6. måned deretter. Hos pasienter med risiko for nedsatt nyrefunksjon er hyppigere overvåking av nyrefunksjonen nødvendig.</p> <p>Ikke-infiserte voksne og ungdom</p> <p>Vennligst referer til "PrEP informasjonsbrosjyre for forskrivere", avsnitt "Emtricitabine/Tenofovir disoproxil-relatert nyretoksisitet"</p>
<input type="checkbox"/>	Utført HBV-screeningstest (hvis tidligere testet negativt for HBV eller ikke hadde fått HBV-vaksinasjon)
<input type="checkbox"/>	Notert neste oppfølgingsavtale og datoer for HIV-1 screening i påminnelseskortet og gitt dette til pasienten

Dato _____

Se oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmaterieill på www.felleskatalogen.no.

Version 2.1, Desember 2024