

SJEKKLISTE FOR FORSKRIVENDE LEGER:

Oppstart med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva som pre-eksponeringsprofylakse (PrEP)

Instruksjoner: Fyll ut sjekklisten ved hvert besøk og arkiver den i pasientens journal.

Jeg har gjennomført følgende før forskrivning av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva til pasienten som skal begynne med eller tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva ved en PrEP-indikasjon:

Første vurdering

- Foretatt risikovurdering for ikke-infisert pasient
- Bekreftet negativ hiv-1-test rett før oppstart med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva ved hjelp av en kombinert antigen/antistofftest
 - Hvis kliniske symptomer som svarer til akutt virusinfeksjon er til stede og det mistenkes nylig (< 1 måned) eksponering, utsettes oppstart av PrEP i minst 1 måned og hiv-1-statusen bekreftes på nytt.
- Utført screening for seksuelt overførbare infeksjoner, som syfilis og gonoré
- Hvis aktuelt, vurdert risiko/nytte for kvinner som kan være gravide eller kan ønske å bli gravide
- Utført HBV-screening
- Tilbudt HBV-vaksinering hvis aktuelt
- Før oppstart, bekreftet estimert kreatininclearance (CrCl):
Ikke- infiserte voksne
CrCl > 80 ml/min. Hvis CrCl < 80 ml/min, bruk bare legemidlet dersom de mulige fordelene anses for å veie opp for de mulige risikoene.
Ikke anbefalt hvis CrCl er < 60 ml/min.
Ikke-infiserte ungdommer
Bør ikke brukes hvis CrCl < 90 ml/min/1,73 m²
- Bekreftet at pasienten med risiko ikke bruker andre hiv-1- eller HBV-legemidler
- Bekreftet at pasienten med risiko ikke bruker eller nylig har brukt et nefrotoksisk legemiddel. Hvis samtidig bruk av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva og et nefrotoksisk legemiddel er uunngåelig, bør nyrefunksjonen overvåkes ukentlig.

Rådgivning

- Gitt råd om at Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva ved en PrEP-indikasjon bare skal brukes som en del av en omfattende forebyggende strategi med opplæring i konsekvent praktisering av sikrere sex og riktig bruk av kondom
- Gitt råd om viktigheten av overholdelse av doseringsplanen
- Anbefalt at pasienten legger en påminnelse på mobiltelefonen sin eller noe annet som kan varsle når det er tid for å ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva
- Gitt råd om viktigheten av planlagt oppfølging, inkludert regelmessig hiv-1-screening (f.eks. minst hver 3. måned), ved bruk av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva ved en PrEP-indikasjon for å bekrefte at status fortsatt er hiv-1-negativ
- Diskutert viktigheten av å seponere Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva ved en PrEP-indikasjon dersom serokonversjon har funnet sted for å redusere utvikling av resistente hiv-1-varianter
- Diskutert viktigheten av at pasienten kjenner sin hiv-1-status, og hvis mulig, partneren(e)s
- Diskutert viktigheten av screening for seksuelt overførbare infeksjoner, som syfilis og gonoré, som kan bidra til hiv-1-overføring
- Diskutert kjente sikkerhetsrisikoer ved bruk av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva ved en PrEP-indikasjon
- Gitt pasienten pasientbrosjyren og påminnelseskortet, og gått igjennom dem sammen med pasienten.

Oppfølging

- Foretatt regelmessig hiv-1-screening (f.eks. minst hver 3. måned)
- Sjekket personens rapporterte overholdelse (f.eks. fra kalenderen på påminnelseskortet)
- Vurdert personen på nytt ved hvert besøk for å bestemme om vedkommende fremdeles har høy risiko for hiv-1-infeksjon. Risikoen for hiv-1-infeksjon bør veies opp mot potensialet for nyre- og benefekter ved langsiktig bruk av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva.
- Seponert Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva som PrEP dersom serokonversjon har funnet sted
- Foretatt screening for seksuelt overførbare infeksjoner, som syfilis og gonoré
- Identifisert mulige bivirkninger
- Foretatt nyreovervåkning som anbefalt
- Hos personer uten nyrerisikofaktorer bør nyrefunksjonen (kreatininclearance og serumfosfat) overvåkes etter 2 til 4 ukers bruk, etter 3 måneders bruk og hver 3. til 6. måned deretter. Hos personer med risiko for nedsatt nyrefunksjon er hyppigere overvåking av nyrefunksjonen nødvendig.
- Foretatt HBV-screening (hvis tidligere testet negativ for HBV eller ikke fått HBV-vaksinering)
- Registrert dato for neste oppfølging og hiv-1-screening i påminnelseskortet og gitt dette til pasienten