

Fingolimod Zentiva (fingolimod) Graviditetsspesifikt pasientpåminnelseskort

Før oppstart av behandling med Fingolimod Zentiva

- **Fingolimod må ikke tas hvis du er gravid, prøver å bli gravid eller en kvinne i fertil alder (inkludert kvinnelig ungdom) som ikke bruker effektiv prevensjon.**
- Fingolimod kan skade et ufødt barn (medisinen menes å være "teratogent"). Før du starter behandling med Fingolimod, vil legen din informere deg om risikoen for et ufødt barn og forklare hva du bør gjøre for å unngå å bli gravid mens du tar Fingolimod.
- Legen din vil be deg om å ta en graviditetstest for å sikre at du ikke er gravid før du starter behandling med Fingolimod.
- Legen din vil informere deg om viktigheten av å bruke sikker prevensjon mens du får behandling og i 2 måneder etter avsluttet behandling. Snakk med legen din om hva som er den mest effektive prevensjons- metoden for deg.
- Les pakningsvedlegget for Fingolimod som du får av legen din.

Mens du er under behandling med Fingolimod Zentiva

- Kvinner må unngå å bli gravide mens de behandles med Fingolimod. Pasientene må bruke sikker prevensjon mens de tar Fingolimod. Kvinner må unngå å bli gravide mens de behandles med Fingolimod og i 2 måneder etter avsluttet behandling.
- Graviditetstester bør gjentas med passende intervaller
- Legen din vil sørge for regelmessig rådgivning angående den alvorlige risikoen for fosterskade ved bruk av Fingolimod.
- **Dersom du blir gravid eller ønsker å bli gravid, må du rådføre deg med legen din fordi det er nødvendig å avslutte behandlingen med Fingolimod.**
- I tilfelle av en graviditet vil legen din gi råd om de alvorlige risikoene for det ufødte barnet, og spesialisert prenatal overvåking bør utføres.

Etter avsluttet behandling med Fingolimod Zentiva

- Informer legen din umiddelbart dersom du tror at MS-sykdommen blir verre (f.eks. svakhet eller synsforandringer) eller hvis du merker nye symptomer etter at du har avsluttet behandlingen med Fingolimod på grunn av graviditet.
- Det er nødvendig å bruke sikker prevensjon i 2 måneder etter avsluttet behandling med Fingolimod fordi det tar så lang tid før Fingolimod er ute av kroppen din.

Rapportering av bivirkninger

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP:

www.dmp.no/pasientmelding

For mer informasjon om Fingolimod Zentiva, se pakningsvedlegget. Det kan også søkes opp på

www.felleskatalogen.no

Kontakt

Zentiva Denmark

Tlf. +45 7070 1313

PV-Norway@zentiva.com