

VIKTIG KONTAKTINFORMASJON

Min leges navn:

Telefonnummer til lege/sykehus:

Annen sykehuskontakt:

Telefonnummer til annen sykehuskontakt:

Telefonnummer utenom åpningstid:

PASIENTINFORMASJON

Navn:

Telefonnummer:

Pårørende/nødkontakt, navn og telefonnummer:

Viktig informasjon til pasienter og pårørende

- IMJUDO® kan forårsake bivirkninger som krever øyeblikkelig legehjelp for å hindre at de forverres
- Hvis du er usikker på oppståtte symptomer, kontakt helsepersonell
- Pasienter, vis dette kortet til enhver lege dere oppsøker
- Se pakningsvedlegg for mer informasjon
- Bivirkninger kan oppstå uker eller måneder etter avsluttet behandling

Viktig informasjon for helsepersonell

- Denne pasienten behandles med IMJUDO® som er assosiert med immunmedierte bivirkninger
- Tidlig diagnose og riktig håndtering er avgjørende for å minimere potensielt livstruende komplikasjoner
- Konsultasjon med onkolog eller pasientens lege kan være nyttig for håndtering av immunmedierte bivirkninger

Sikkerhetsinformasjon  Etter krav fra Direktoratet for medisinske produkter

IMJUDO® (tremelimumab) Pasientkort

Dette pasientkortet er kun beregnet for pasienter som har fått forskrevet IMJUDO® og deres pårørende. Pasienter bør ha med seg dette kortet til enhver tid

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se www.dmp.no/pasientmelding

Hva du skal gjøre hvis du har mistanke om en bivirkning, selv om den ikke står oppført i dette kortet eller i pakningsvedlegget

- Dersom du opplever symptomer, kontakt helsepersonell eller oppsøk lege
- IKKE behandle symptomer selv før du har snakket med din lege
- IKKE nøl med å kontakte lege

Symptomer som virker milde kan raskt forverres hvis de ikke behandles.

Mulige symptomer

ØYNE

- Tåkesyn
 - Dobbeltsyn
 - Gulning av det hvite i øynene
-

BRYST

- Brystsmerter
- Uregelmessige eller raske hjerteslag
- Pustevansker
- Ny eller forverret hoste

MAGE OG TARM

- Vedvarende smerter i magen
 - Alvorlig kvalme eller oppkast
 - Diaré
 - Alvorlig forstoppelse
-

MUSKLER OG LEDD

- Vedvarende eller kraftige muskelsmerter, svakhet eller lammelse
- Stivhet i skuldre, nakke eller hofter
- Prikking eller nummenhet i armer eller ben

HUD

- Gulning av hud
 - Utslett og/eller kløe
 - Økt svetting
-

GENERELT

- Feber
- Kraftig hodepine
- Forvirring
- Svimmelhet
- Ekstrem tretthet
- Uforklarlig vekttap
- Hovne ankler
- Blod i urinen