

▼ Increlex® Doseringsveileder

Hvordan bruke Increlex® ved behandling av alvorlig primær IGF-1-mangel.

Forskrivningsinformasjon kan finnes på slutten av dokumentet.

Hvordan pasienter skal bruke Increlex®

Informasjon til foreldre, omsorgspersoner og pasienter

Fyll inn pasientens navn og dose før du gir skjemaet til pasienten - det inneholder nyttig og viktig informasjon om hvordan Increlex® skal administreres.

Hvordan denne veilederen skal brukes (forskrivers veileder)

Tabellene på de følgende sidene er laget for å hjelpe deg å beregne riktig dose per injeksjon for pasienten. Når du har funnet pasientens kroppsvekt i første kolonne, er korresponderende tall under «dose per injeksjon (mg/kg)» antallet enheter per injeksjon.

Dose (i enheter) per injeksjon er kalkulert ved hjelp av følgende formel:

Vekt (kg) x enkeltdose (mg/kg) x 10 = enheter per injeksjon

Anbefalt startdose er 0,04 mg/kg to ganger daglig gitt som subkutan injeksjon. Dersom dette tolereres godt av pasienten i minst én uke, kan dosen økes i trinn på 0,04 mg/kg opptil maksimumsdosen på 0,12 mg/kg to ganger daglig.

Dosen er kalkulert i enheter ettersom Increlex® administreres ved bruk av insulinsprøyte.

- Dosen varierer fra 0,04 mg/kg til 0,12 mg/kg to ganger daglig
- Antall sprøyteenheter varierer fra 2 enheter til 84 enheter
- Injeksjonsstedet må **varieres** med hver injeksjon
- Increlex® skal alltid gis **like før** eller **like etter et måltid**

Hypoglykemi

Dersom hypoglykemi oppstår ved anbefalte doser, til tross for tilfredsstillende matinntak, skal dosen reduseres.

▼ Increlex® er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning på elektronisk meldeskjema: www.dmp.no/meldeskjema.

For pasienter mellom 5 og 37 kg

Patient's weight (kg)	Dose per injection (mg/kg) twice daily									
	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10	.11	.12	
5	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
6	2	3	4	4	5	5	6	7	7	
7	3	4	4	5	6	6	7	8	8	
8	3	4	5	6	6	7	8	9	10	
9	4	5	5	6	7	8	9	10	11	
10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
13	5	7	8	9	10	12	13	14	16	
14	6	7	8	10	11	13	14	15	17	
15	6	8	9	11	12	14	15	17	18	
16	6	8	10	11	13	14	16	18	19	
17	7	9	10	12	14	15	17	19	20	
18	7	9	11	13	14	16	18	20	22	
19	8	10	11	13	15	17	19	21	23	
20	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
21	8	11	13	15	17	19	21	23	25	
22	9	11	13	15	18	20	22	24	26	
23	9	12	14	16	18	21	23	25	28	
24	10	12	14	17	19	22	24	26	29	
25	10	13	15	18	20	23	25	28	30	
26	10	13	16	18	21	23	26	29	31	
27	11	14	16	19	22	24	27	30	32	
28	11	14	17	20	22	25	28	31	34	
29	12	15	17	20	23	26	29	32	35	
30	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
31	12	16	19	22	25	28	31	34	37	
32	13	16	19	22	26	29	32	35	38	
33	13	17	20	23	26	30	33	36	40	
34	14	17	20	24	27	31	34	37	41	
35	14	18	21	25	28	32	35	39	42	
36	14	18	22	25	29	32	36	40	43	
37	15	19	22	26	30	33	37	41	44	

For pasienter mellom 38 og 70 kg

Patient's weight (kg)	Dose per injection (mg/kg) twice daily								
	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10	.11	.12
38	15	19	23	27	30	34	38	42	46
39	16	20	23	27	31	35	39	43	47
40	16	20	24	28	32	36	40	44	48
41	16	21	25	29	33	37	41	45	49
42	17	21	25	29	34	38	42	46	50
43	17	22	26	30	34	39	43	47	52
44	18	22	26	31	35	40	44	48	53
45	18	23	27	32	36	41	45	50	54
46	18	23	28	32	37	41	46	51	55
47	19	24	28	33	38	42	47	52	56
48	19	24	29	34	38	43	48	53	58
49	20	25	29	34	39	44	49	54	59
50	20	25	30	35	40	45	50	55	60
51	20	26	31	36	41	46	51	56	61
52	21	26	31	36	42	47	52	57	62
53	21	27	32	37	42	48	53	58	64
54	22	27	32	38	43	49	54	59	65
55	22	28	33	39	44	50	55	61	66
56	22	28	34	39	45	50	56	62	67
57	23	29	34	40	46	51	57	63	68
58	23	29	35	41	46	52	58	64	70
59	24	30	35	41	47	53	59	65	71
60	24	30	36	42	48	54	60	66	72
61	24	31	37	43	49	55	61	67	73
62	25	31	37	43	50	56	62	68	74
63	25	32	38	44	50	57	63	69	76
64	26	32	38	45	51	58	64	70	77
65	26	33	39	46	52	59	65	72	78
66	26	33	40	46	53	59	66	73	79
67	27	34	40	47	54	60	67	74	80
68	27	34	41	48	54	61	68	75	82
69	28	35	41	48	55	62	69	76	83
70	28	35	42	49	56	63	70	77	84

Hvordan du skal bruke Increlex®

Pasientens navn:

Dose i enheter:

Kontaktinformasjon:

Legens navn:

Sykepleiers navn:

Telefonnummer til legekantor:

- Increlex® skal gis **to ganger daglig**
- Increlex® skal gis **like før** eller **like etter et måltid**
- Hvis Increlex®-dosen ikke kan gis like før eller etter et måltid, skal dosen ikke gis i det hele tatt
- Vær oppmerksom på tegn og symptomer på lavt blodsukker som lege eller sykepleier har informert deg om. Ha alltid noe sukkerholdig tilgjengelig, i tilfelle tegn og symptomer på lavt blodsukker oppstår.
- Bruk **forskjellig injeksjonssted** på huden for hver dose

Roter mellom følgende injeksjonssteder

- **Mage**
 - **Lår**
 - **Seteregion**
 - **Overarm**
- Dersom en dose ikke tas, skal den neste dosen aldri økes for å erstatte den utelatte dosen. Den neste dosen skal tas som vanlig til planlagt tid.
 - Increlex® skal oppbevares i kjøleskap, men skal **IKKE** fryses.
Oppbevares ved 2-8 °C

Se oppdatert pakningsvedlegg, preparatomtale (SmPC) og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no.