

# INTRAVENØS (IV)

## JERNBEHANDLING

**Viktig informasjon om risiko for alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av intravenøst jern (medisiner som gis direkte i blodet via en nål i en blodåre)**

Les pakningsvedlegget og denne brosjyren nøye, og snakk med legen din om du har spørsmål eller trenger mer informasjon.



### Rapportering av bivirkninger

Snakk med lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger.

Det gjelder også for andre bivirkninger enn de som står oppført i denne brosjyren eller i pakningsvedlegget.

Du kan rapportere bivirkninger ved å fylle ut et elektronisk skjema hos DMP (Direktoratet for medisinske produkter): [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding)

## PASIENT Opplæringsmaterieill ved bruk av jern- karboksymaltose

**Intravenøst (IV) jern brukes til å behandle jernmangel når jernprodukter som skal tas via munnen ikke har ønsket effekt eller ikke kan brukes.**

**Intravenøst (IV) jern kan gi allergiske reaksjoner og må gis av personer opplært i å vurdere og håndtere slike reaksjoner.**

**Noen allergiske reaksjoner, kan være alvorlige eller livstruende, og kalles anafylaktisk reaksjoner. Disse kan påvirke hjerte og blodtrykk, og føre til besvimelse eller bevisstløshet.**

## Du kan ha økt risiko for å få en allergisk reaksjon hvis du har:

- kjente allergier, inkludert allergier mot medisiner
- Tidligere hatt alvorlig astma, eksem eller andre allergier (for eksempel mot støv, pollen og/ eller dyrehår) eller
- immun - eller betennelses-tilstander som revmatoid artritt, lupus erythematosus eller lignende sykdommer

## Fortell legen din eller sykepleier før de skriver ut eller gir IV-jern

hvis du har noen av disse allergiene eller tilstandene.

Legen din vil avgjøre om fordelene ved behandlingen veier opp for eventuelle risikoer.

## Du bør ikke få foreskrevet eller gitt jern intravenøst dersom:

- du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffet eller et av de andre innholdstoffene i dette legemidlet
- du tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner på annen intravenøs jernbehandling\*
- du har jernoverskudd (for mye jern i kroppen)
- din blodmangel (anemi) ikke skyldes jernmangel

## Fortell legen din eller sykepleier før de skriver ut eller gir IV-jern

hvis du har noen av disse allergiene eller tilstandene.

**\* Viktig: en allergisk reaksjon kan fortsatt skje selv om du tidligere har fått intravenøst jern uten problemer.**

**Graviditet:** IV-jern bør ikke brukes under graviditet med mindre det er strengt nødvendig. Hvis du er gravid eller tror du kan være gravid, er det viktig å ta dette opp med legen din.

## Kontakt legen din eller sykepleier umiddelbart hvis:

- Du opplever tegn eller symptomer på en allergisk reaksjon under eller kort tid etter behandling med intravenøst jern.

Symptomer kan være: elveblest eller utslett, kløe, svimmelhet, ørhet, hevelse i lepper, tunge, hals eller kropp, pustevansker, kortpustethet eller hvesing.

- Du vil bli overvåket av legen eller sykepleieren i minst 30 minutter etter hver behandling for å sikre rask hjelp dersom en reaksjon skulle oppstå.

## Kontaktinformasjon Viatris:

Epost: [infonorge@viatris.com](mailto:infonorge@viatris.com)  
Telefon: + 47 66 75 33 00

Lokal versjon 1.0  
Dato: Mars 2025