

# КІТРУДА® (KEYTRUDA®)

## (пембролізумаб)

Цей препарат може викликати серйозні побічні реакції, які іноді можуть бути небезпечними для життя та призвести до летального випадку. Вони можуть виникнути будь-коли під час лікування або навіть після його припинення. У Вас може виникнути кілька побічних реакцій одночасно.

Негайно зверніться до Вашого лікаря, якщо у Вас з'явилися будь-які ознаки або симптоми, включаючи ті, що не зазначені у цій картці-пам'ятці.

Ваш лікар може призначити Вам прийом інших лікарських засобів для запобігання більш серйозним ускладненням та зменшення вираженості симптомів, що виникли.

З причини виникнення побічних ефектів Ваш лікар може відкласти призначення наступної дози препарату КІТРУДА. Якщо виникають небезпечні побічні ефекти, лікування препаратом КІТРУДА може бути припинено.

Для отримання додаткової інформації перегляньте листок-вкладиш до препарату KEYTRUDA. Його можна знайти на сайті [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no).

### ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- Не займайтесь самостійною діагностикою та лікуванням побічних ефектів.
- Не припиняйте лікування препаратом КІТРУДА, якщо Ви не погодили це зі своїм лікарем.
- **Завжди носіть цю картку з собою**, особливо під час подорожей, коли звертається до відділення невідкладної допомоги або відвідуєте іншого лікаря.
- Завжди інформуйте всіх медичних працівників, що Ви лікуєтеся препаратом КІТРУДА, і покажіть їм цю картку-пам'ятку.

## Картка-пам'ятка пацієнта

### Легені

- задишка
- біль в грудній клітці
- кашель

### Кишечник

- діарея або більша кількість випорожнень, ніж зазвичай
- чорні, смолисті, липкі калові маси або калові маси з домішками крові чи слизу
- сильний або ниючий біль у шлунку
- нудота або блювання

### Печінка

- нудота або блювання
- поганий апетит
- біль у правому боці живота
- пожовтіння шкіри або білків очей
- темна сеча
- схильність до кровотеч та синців

### Нирки

- зміни у кількості або кольорі сечі

### Ендокринні залози

- прискорене серцебиття
- втрата або збільшення ваги
- надмірне потовиділення
- випадіння волосся
- мерзлякуватість
- закреп
- зниження тембру голосу
- біль у м'язах
- головокружіння або запаморочення
- постійний або незвичний головний біль

### Цукровий діабет 1 типу

- сильніше, ніж зазвичай, відчуття голоду чи спраги
- часте сечовипускання
- втрата ваги
- втомлюваність або відчуття нездоров'я
- біль у животі
- швидке і глибоке дихання
- спантеличеність
- незвична сонливість
- солодкий запах з роти
- солодкий або металевий присмак у роті
- незвичний запах сечі або поту

- **Зверніться до лікаря, фармацевта або середнього медичного персоналу, якщо у Вас виникли побічні ефекти. Це також стосується побічних ефектів, не зазначених у листку-вкладиші. Про побічні ефекти також можна повідомити в електронному вигляді до Норвезького агентства з лікарських засобів на [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding).**
- **Повідомляючи про побічні ефекти, Ви допомагаєте зібрати інформацію про безпеку використання цього препарату.**

## Важливі контактні дані

ПІБ онколога/лікуючого лікаря

Робочий номер телефону  
онколога/лікуючого лікаря

Номер телефону, за яким можна  
зв'язатися з лікарем у неробочий час

Моє ПІБ

Мій номер телефону

Контакт для екстреного випадку  
(ПІБ та номер телефону)

## Важлива інформація для медичного персоналу

Цей пацієнт проходить лікування препаратом КІТРУДА (пембролізумаб), який може викликати імуноопосередковані побічні реакції, що можуть виникнути у будь-який час під час лікування і навіть після його припинення. Оцініть наявність ознак та симптомів імуноопосередкованих побічних реакцій. Рання діагностика та відповідне лікування необхідні для мінімізації будь-яких несприятливих побічних реакцій, пов'язаних з імунною системою.

При підозрі виникнення імуноопосередкованих побічних реакцій необхідно провести ретельне обстеження для підтвердження їхньої причини чи виключення інших причин. Детальні рекомендації щодо лікування імуноопосередкованих побічних реакцій викладені у стислій інформації (SPC) про препарат KEYTRUDA.

Проконсультуйтеся з онкологом або іншим спеціалістом щодо лікування органоспецифічних імуноопосередкованих побічних реакцій.

Перегляньте стислу інформацію (SPC) про препарат KEYTRUDA на [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no) або для отримання додаткової інформації зателефонуйте до відділу медичної інформації MSD (Norge) AS за тел. +47 32 20 73 00



MSD (Norge) AS, Pb. 1579 Vika, 0118 Oslo, tlf. 32 20 73 00.  
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.  
Всі права захищені. NO-KEY-00516 10/24

Версія №13, жовтень 2024