

# KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Kan forårsake akutte og alvorlige bivirkninger som noen ganger kan være livstruende og føre til død. Disse kan forekomme når som helst under behandlingen, eller til og med etter at behandlingen er ferdig. Du kan oppleve mer enn en bivirkning samtidig.

Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt på dette kortet.

For å forhindre alvorlige komplikasjoner og redusere symptomer, kan legen gi deg behandling med andre legemidler.

Grunnet bivirkninger kan legen anse det som nødvendig å holde tilbake neste dose med KEYTRUDA. Ved alvorlige bivirkninger kan behandling med KEYTRUDA stoppes.

For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget for KEYTRUDA. Kan søkes opp hos [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no)

## VIKTIG

- Ikke vær fristet til å behandle bivirkningene selv.
- Ikke avbryt behandlingen med KEYTRUDA uten at du har diskutert det med legen din.
- **Ha alltid dette kortet med deg**, spesielt når du er på reise, når du skal til legevakten eller når du skal besøke en annen lege.
- Husk å fortelle til alt helsepersonell du besøker at du behandles med KEYTRUDA, og vis dem dette kortet.

# Pasientkort

## Lunger

- Kortpustethet
- Brystsmerter
- Hoste

## Tarmer

- Diaré eller oftere avføring enn vanlig
- Svart, tjæreaktig, klebrig avføring eller avføring med blod eller slim
- Kraftige magesmerter eller ømhet
- Kvalme eller oppkast

## Lever

- Kvalme eller oppkast
- Mindre sultfølelse
- Smerter på høyre side av magen
- Guldfarging av hud eller det hvite i øyet
- Mørk urin
- Får lettere blødninger eller blåmerker enn normalt

## Nyrer

- Endring i mengde eller farge på urinen

## Hormonkjertler

- Rask hjerterytme
- Vekttap eller vektøkning
- Økt svette
- Hårfall
- Kuldefølelse
- Forstoppelse
- Dypere stemme
- Muskelverk
- Svimmelhet eller besvimelse
- Hodepine som ikke forsvinner eller uvanlig hodepine

## Type 1 diabetes, inkludert diabetisk ketoacidose

- Følelsen av å være mer sulten eller tørst enn vanlig
- Behov for hyppigere urinerings
- Vekttap
- Trøtthet eller sykdomsfølelse
- Magesmerter
- Rask og dyp pusting
- Forvirring
- Uvanlig søvnighet
- Søtlig lukt fra pusten
- Søtlig eller metallisk smak i munnen
- Urinen eller svetten endrer lukt

• **Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Bivirkninger kan også meldes på elektronisk skjema til Direktoratet for medisinske produkter: [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding).**

• **Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.**

## Viktig kontaktinformasjon

Onkologens/legens navn

Telefonnummer til onkolog/legen

Telefonnummer utenfor vanlig åpningstid

Mitt navn

Mitt telefonnummer

Pårørende (navn og telefonnummer)

## Viktig informasjon for helsepersonell

Denne pasienten blir behandlet med KEYTRUDA (pembrolizumab), som kan forårsake akutte og alvorlige immunmedierte bivirkninger som kan forekomme når som helst under behandlingen, eller til og med etter at behandlingen er ferdig. Vurder pasienten for tegn og symptomer på immunmedierte bivirkninger. Tidlig diagnose og hensiktsmessig håndtering er viktig for å minimere konsekvensene av immunmedierte bivirkninger.

Ved mistanke om immunmedierte bivirkninger må det gjøres en adekvat undersøkelse for å bekrefte etiologi eller ekskludere andre årsaker. Spesielle retningslinjer for håndtering av immunmedierte bivirkninger finnes i preparatomtalen (SPC) til KEYTRUDA.

Konsulter en onkolog eller annen medisinsk spesialist for håndtering av organspesifikke immunmedierte bivirkninger.

Vennligst se preparatomtalen (SPC) for KEYTRUDA på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no) eller ring MSD (Norge) AS, Medisinsk Informasjon, tlf. 32 20 73 00 for ytterligere informasjon.

