

Klexane skal vanligvis gis som injeksjon i underhuds fett i mageområdet (subkutan injeksjon). Legemiddelet finnes i ferdigfylte engangssprøyter som inneholder riktig dose. Det er viktig at du følger nøyaktig den dosering som legen har angitt. Følgende anvisning hjelper deg å bruke legemiddelet slik at injeksjonen blir riktig. Følg anvisningen nøye.

Hvordan du bruker Klexane®

Klexane ferdigfylte engangssprøyter brukes slik ved subkutan injeksjon:

1. **Fjern beskyttelseshetten** (gummien) ved å trekke den av samtidig med at den vrir lett rundt.



2. Sprøytene er klare til bruk og trenger ikke renses. **Luftboblen i sprøyten skal ikke fjernes** før injeksjon da dette kan føre til tap av legemiddel og dermed redusert dose.



3. Du bør **sitte eventuelt ligge** når du skal sette sprøyten på deg selv.
4. **Det ideelle injeksjonssted er underhuds fett i flankene (i maveregionen)** eller i området rundt navlen. Sett alltid sprøyten vekselvis på høyre og venstre side.



5. **Løft huden og underhuds fett** mellom tommel og pekefinger.



6. **Før sprøytespissen med hele dens lengde rett inn** i den sammenklemtede hudfolden.



7. **Hold hudfolden fast** mellom tommel og pekefinger under hele injeksjonstiden.
8. **Sprøyt inn dosen langsomt.** Hele volumet i sprøyten skal brukes. Spissen trekkes litt tilbake og holdes noen sekunder før den trekkes helt ut (for å unngå lekkasje).
9. **Sett beskyttelseshetten på etter bruk**, og sprøyten kastes på forsvarlig vis.

Se pakningsvedlegg for fullstendig informasjon om bruk.