

Pasientkort

– viktig sikkerhetsinformasjon

LITFULO®
(ritlecitinib)

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning: www.dmp.no/pasientmelding

Versjon 3.0 – April 2026

Sikkerhetsinformasjon til pasienter om Litfulo:

- Dette kortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til – før og under behandling med Litfulo.
- Du finner mer informasjon i pakningsvedlegget som følger med hver pakning med Litfulo.
- Spør legen din eller på apoteket hvis noe av informasjonen er uklar.

-2-

Versjon 3.0 – April 2026

Hva Litfulo er og hva det brukes mot

Litfulo inneholder virkestoffet ritlecitinib. Det brukes til å behandle alvorlig alopecia areata hos voksne og ungdommer på 12 år og eldre. Alopecia areata er en sykdom der kroppens eget immunforsvar angriper hårsekkene, noe som fører til betennelse og gir hårtap på hodet, i ansiktet og/eller på andre deler av kroppen.

Litfulo virker ved å redusere aktiviteten til enzymer som kalles JAK3- og TEC-kinaser, som medvirker til betennelse i hårsekken. Dette reduserer betennelsen, noe som fører til at håret vokser ut igjen hos pasienter med alopecia areata.

-3-

Versjon 3.0 – April 2026

Risiko for infeksjoner

Snakk med lege eller apotek før og under behandling med Litfulo dersom noe av følgende gjelder deg:

- Du har en infeksjon (med symptomer som feber, svette, frysninger, muskelsmerter, hoste, kortpustethet, blod i slimet, vekttap, diaré, magesmerter, brennende følelse når du tisser, eller at du må tisse oftere enn vanlig, kraftig trøtthetsfølelse).

-4-

Versjon 3.0 – April 2026

- Du har, eller har hatt, tuberkulose eller har vært i nærkontakt med noen som har tuberkulose, eller du bor eller reiser i områder der tuberkulose er svært vanlig. Legen din vil teste deg for tuberkulose før du starter med Litfulo, og kanskje også teste deg på nytt senere under behandlingen.
- Du en gang tidligere har hatt en herpes-infeksjon (f.eks. vannkopper eller helvetesild) siden Litfulo kan gjøre at den kommer tilbake. Snakk med legen din dersom du får et smertefullt hudutslett med blemmer, da dette kan være et tegn på helvetesild.

-5-

Versjon 3.0 – April 2026

Annen informasjon (vennligst fyll ut):

Ditt navn:

Legens navn (som har foreskrevet Litfulo):

Legens telefonnummer:

Datoen du startet med Litfulo:

-6-

Vaksinasjoner

- Snakk med lege eller apotek hvis du nylig har tatt eller planlegger å ta en vaksine, fordi enkelte levende vaksiner (for eksempel enkelte vaksiner mot influensa, poliomyelitt, rotavirus, vannkopper, gulfeber, denguevirus, samt vaksine mot meslinger, røde hunder og kuma (MMR-vaksine)) ikke anbefales umiddelbart før og mens du bruker Litfulo.

-7-

Versjon 3.0 – April 2026

Risiko for hudkreft

- Si fra til legen dersom du oppdager nye utvekster på huden. Snakk med lege eller apotek dersom du har kreft eller har hatt kreft, siden det ikke er klart om Litfulo øker risikoen for hudkreft. Legen din vil diskutere med deg om behandling med dette legemidlet er egnet for deg, og om det er nødvendig med kontroller under behandlingen, inkludert regelmessige hudundersøkelser.

-8-

Versjon 3.0 – April 2026

Risiko for blodpropp

Oppsøk legehjelp umiddelbart dersom noe av følgende gjelder deg:

- Du får blodpropp i beina (dyp venetrombose) eller lungene (lungeemboli). Kontakt lege dersom du får et vondt og hovent bein, brystmerter eller kortpustethet, da dette kan være tegn på blodpropp i venene.
- Du får blodpropp i øyet (netthinneokklusjon) eller i hjertet (hjerteinfarkt). Kontakt lege dersom du opplever akutte endringer i synet (tåkesyn, delvis eller fullstendig synstap), brystmerter eller kortpustethet, da disse endringene kan være et tegn på blodpropp i arteriene.

-9-

Versjon 3.0 – April 2026

- Du får blodpropp i hjernen (hjerneslag). Kontakt lege dersom du opplever skjevhet i ansiktet, kraftig hodepine, problemer med å snakke, nummenhet eller nedsatt kraft på en side av kroppen eller problemer med balansen. Dette kan være tegn på hjerneslag.

Risiko for neurologiske symptomer

Snakk med legen din eller apoteket før og under behandlingen hvis du har uforklarlige symptomer forårsaket av et problem med nervesystemet mens du tar Litfulo.

-10-

Versjon 3.0 – April 2026

Prevensjon og graviditet

Litfulo SKAL IKKE brukes under graviditet. Det finnes ingen eller begrensede data vedrørende bruk av Litfulo hos gravide kvinner.

Dersom du er kvinne i fertil alder, må du bruke sikker prevensjon under behandling med Litfulo og i minst én måned etter den siste Litfulo-dosen. Snakk med legen din om egnede prevensjonsmetoder. Informer legen din umiddelbart dersom du blir gravid eller tror at du kan ha blitt gravid under behandlingen, da Litfulo kan skade barnets utvikling.

-11-

Versjon 3.0 – April 2026

Du bør alltid ha med deg dette kortet. Vis det til helsepersonell som er involvert i den medisinske behandlingen – for eksempel på apoteket eller til legen på legevakten.

Du bør kjenne til enkelte bivirkninger og annen informasjon som er angitt nedenfor.

Snakk med legen din hvis du får noen bivirkninger.

For mer informasjon, se Litfulo pakningsvedlegg i pakningen eller på www.felleskatalogen.no.

-12-

Versjon 3.0 – April 2026