

Sikkerhetsinformasjon



Etter krav fra
Direktoratet for
medisinske produkter

Viktig informasjon til deg som får
behandling med Lucentis®

Denne brosjyren er laget for å gi deg en bedre forståelse av bruken av LUCENTIS® for behandling av:

- neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)
- proliferativ diabetisk retinopati (PDR)
- synssvekkelse som skyldes diabetisk makulaødem (DME)
- synssvekkelse som skyldes koroidal neovaskularisering (CNV)
- synssvekkelse som skyldes makulaødem som følge av veneokklusjon i netthinnen (grenveneokklusjon eller sentralveneokklusjon)

HVORDAN GIS LUCENTIS® BEHANDLING?

- Lucentis® gis av øyelegen som en injeksjon i øyet
 - Det er normalt å engste seg for en slik injeksjon, men de fleste pasienter sier at injeksjonen er smertefri og at det høres verre ut enn hva det egentlig er¹
 - o De fleste pasientene rapporterte at en eventuell uro for injeksjonene forsvant etter første injeksjon¹

HVA VIL SKJE HOS LEGEN?

- **På behandlingsdagen vil man passe på at du slapper best mulig av og har det komfortabelt**
- Dersom du har hatt slag eller “drypp” (forbigående tegn på slag, som svakhet eller lammelse i ansikt/armer/ben, vansker med å snakke eller forstå), må du informere legen din om det før du får Lucentis[®], så det kan avgjøres om det er den beste behandlingen for deg
- Informer legen dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, det gjelder også reseptfrie preparater
- **En lege eller sykepleier vil:**
 - > dekke til ansiktet ditt og området rundt øyet med en spesiell drapering
 - > rengjøre øyet ditt og huden rundt øyet
 - > holde øyet ditt åpent så du ikke blunker
 - > gi lokalbedøvende øyedråper så du ikke vil føle smerte
- **Legen vil deretter sette injeksjonen i den hvite delen av øyet. Du kan føle litt trykk på øyet når injeksjonen settes**
- **Det er viktig at du sier fra til legen din hvis du**
 - > har en øyeinfeksjon
 - > har noen form for smerte eller rødhet i øyet
 - > tror du kan være allergisk mot Lucentis[®] eller mot Betadine^{®†} (jod)

1. Thetford C, et al. Br J Vis Impair. 2013; 31(2): 89-101. †Betadine er et registrert varemerke eiet av Mundipharma AG.

HVA SKJER ETTER AT JEG HAR FÅTT INJEKSJONEN MED LUCENTIS®?

- **Legen din vil undersøke øyet for å kontrollere at behandlingen har gått bra, dette innebærer også at trykket i øyet måles**
- **Den hvite delen av øyet der injeksjonen ble satt vil sannsynligvis bli rød**
 - > Slik rødhet er normalt og vil forsvinne i løpet av et par dager
 - > Ta kontakt med legen din dersom rødheten ikke blir borte eller blir verre
- **Du kan oppleve å se noen flekker eller ”flytere” i synsfeltet**
 - > Dette er normalt og flekkene bør forsvinne i løpet av et par dager
 - > Ta kontakt med legen din dersom de ikke blir borte eller blir verre
- **Pupillene dine vil bli utvidet før injeksjonen, dette kan gjøre at du ser dårligere i noen timer etter behandlingen**
 - > Du bør ikke kjøre bil før synet har blitt normalt igjen

HVA SKJER ETTER AT JEG HAR FÅTT INJEKSJONEN MED LUCENTIS®? (forts)

- **Det er viktig å følge med på eventuelle forandringer som skulle oppstå i øyet eller i resten av kroppen i uken etter injeksjonen**
Injeksjoner i øyet kan i sjeldne tilfeller forårsake infeksjon
- **Du må kontakte legen din snarest mulig dersom du skulle oppleve noen av de følgende tegn eller symptomer i øyet:**
 - > Smerter
 - > Lysfølsomhet/tåreflod
 - > Hevelse i øyelokket eller andre områder
 - > Økende rødhet
 - > Uklart eller fordreid syn eller plutselig synstap
 - > Lysglimt
 - > Fluer eller svarte flekker i synsfeltet eller fargede ringer rundt objekter
 - > Tørrhet i øyet
- **Kontakt lege eller apotek dersom du merker bivirkninger som ikke er nevnt i denne brosjyren**

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til Direktoratet for medisinske produkter (DMP):

www.dmp.no/pasientmelding

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

HVOR LENGE MÅ JEG FORTSETTE BEHANDLING MED LUCENTIS®?

- **Alle pasienter er forskjellige. Du vil sannsynligvis trenge flere injeksjoner med Lucentis®, men det vil avhenge av hvordan synet ditt endrer seg**
- **Snakk med legen din om hvilke resultater behandlingen har gitt deg og hva du føler om behandlingen**
- **Det er viktig å fortsette kontrollene hos legen**
 - > Den beste måten du kan bevare synet ditt og opprettholde en uavhengig livsstil på er å gå til regelmessige kontroller hos legen
 - > Diskuter dine behandlingsmuligheter med legen din
- **Dersom du vurderer å stoppe behandlingen med Lucentis®, må du rådføre deg med legen din først**
- **Snakk med legen din dersom du har andre spørsmål om bruken av dette legemidlet**
- **Følg alle instruksjoner fra legen nøye. De kan være annerledes enn den generelle informasjonen i denne brosjyren**

Legen din vil avgjøre hvor ofte du bør komme til kontroll og vil avgjøre om du trenger ytterligere behandling.

Møt alltid opp til avtalte kontroller hos legen.

Dersom du går glipp av en planlagt behandling med Lucentis[®], må du kontakte legen din så snart som mulig.

**Ta vare på denne brosjyren.
Du kan få behov for å lese den igjen.**

Snakk med lege eller apotek dersom du har andre spørsmål.

Dersom du opplever tegn eller symptomer du tror kan være relatert til bruken av Lucentis[®], men som ikke er nevnt i denne brosjyren, må du informere legen din.

Novartis Norge AS

PB: 4284 Nydalen, 0401 Oslo, Tlf. 23052000, www.novartis.no