

# Brukerveiledning

Menopur<sup>®</sup>


600 IU / 1200 IU

pulver og væske  
til injeksjonsvæske,  
oppløsning



## Sørg for at du har alle delene du trenger før du begynner forberedelsene

- 1 Hetteglass med Menopur  
(600 IU med oransje hette / 1200 IU med hvit hette)
- 2 Sprøyter med oppløsningsvæske  
(1 sprøyte for 600 IU / 2 sprøyter for 1200 IU)
- 3 Tilberedningskanyle
- 4 Engangssprøyter til injisering (9 stk for 600 IU / 18 stk for 1200 IU)








### Viktig!

Menopur skal oppbevares i kjøleskapet før blanding.  
Hetteglasset inneholder legemiddel til flere dagers behandling.

## Forberedelse


- 1 Fjern beskyttelseheten fra hetteglasset med pulver.
- 2 Fjern gummibeskyttelsen fra sprøyten med oppløsningsvæske.
- 3 Åpne tilberedningskanylen ved å vri av endestykket.
- 4 Fest tilberedningskanylen på sprøyten med oppløsningsvæske.
- 5 Fjern beskyttelseheten fra tilberedningskanylen.



## Blanding

- 1 Stikk kanylen gjennom midten av gummiproppen på hetteglasset med pulver, og sprøyt all væsken sakte ned i hetteglasset slik at det dannes færrest mulig bobler.

*Når oppløsningsvæsken tilsettes, dannes et lite overtrykk i hetteglasset. Slipp derfor sprøytens stempel og la det stige opp av seg selv i omtrent 10 sekunder. Dette vil utligne overtrykket i hetteglasset.*



- 2 Trekk den tomme sprøyten med kanylen sittende på, ut av hetteglasset.
- 3 Sving hetteglasset rolig rundt (ikke rist) for å løse opp pulverket.


*Pulveret skal løse seg raskt opp (innen to minutter) til en klar oppløsning. Selv om dette normalt skjer når bare få dråper av oppløsningsvæske er tilsatt, skal all oppløsningsvæske tilsettes. Ikke bruk løsningen hvis den ikke er klar eller hvis den inneholder partikler.*



### OBS:

Dersom du skal blande **Menopur 600 IU**, gå videre til punkt 2.  
Dersom du skal blande **Menopur 1200 IU**, skal du lese videre her.

Sørg for at kanylespissen er over væsknivået i hetteglasset.  
Fjern deretter den første sprøyten forsiktig fra kanylen ved å vri.  
Kanylen skal sitte igjen i hetteglasset.




Ta den andre sprøyten med oppløsningsvæske, som følger med i pakningen. **Utfør steg 2 under "Forberedelse"** også med denne sprøyten. Fest deretter sprøyten til kanylen som sitter i hetteglasset, og sprøyt langsomt all væsken ned i hetteglasset.

- 4 Legemidlet er nå klart til bruk, eller det kan oppbevares i romtemperatur (under 25°C) i opptil 28 dager.


## Injisering

- 1 Åpne en av engangssprøytene og fjern beskyttelseshetten. Stikk kanylen gjennom gummiproppen på hetteglasset. Det er viktig å stikke midt i gummiproppen. Trykk stempelet helt ned, mens kanylen er over væsken.
- 2 Vend hetteglasset opp ned som vist på bildet, og trekk opp riktig mengde oppløsning i engangssprøyten (bruk sprøytens gradering). Trekk engangssprøyten ut av hetteglasset. Hold sprøyten opp ned og trekk inn litt luft. Knips lett på sprøyten slik at eventuelle luftbobler stiger opp. Trykk så sakte på stempelet til den første væskedråpen kommer til syne ved kanylespissen.



Desinfiser og injiser som anvist av legen/sykepleieren din.

- 3 Lag en hudfold på magen på høyre eller venstre side med den ene hånden. Med den andre hånden føres kanylen på sprøyten i 90 graders vinkel gjennom huden. Trykk stempelet rolig inn til sprøyten er helt tom. Trekk deretter sprøyten ut. Etter at sprøyten er trukket ut, trykk lett på injeksjonsstedet og massér forsiktig. Oppløsningen vil da fordele seg bedre under huden.



- 4 Varier injeksjonssted i samsvar med lege/sykepleiers instruksjon.
- 5 Legg brukte kanyler i en passende avfallsbeholder for skarpe gjenstander, for eksempel en tom melkekartong eller brusflaske.
- 6 Resten av Menopur-oppløsningen i hetteglasset kan oppbevares i opptil 28 dager ved romtemperatur (under 25°C).

### OBS:

Vær oppmerksom på at hetteglasset inneholder legemiddel til flere dagers behandling. Trekk derfor bare opp den dosen som du har fått beskjed om å bruke.

# Viktig!

## Før blanding:

Menopur skal oppbevares i kjøleskap.

## Etter blanding:

Menopur kan oppbevares ved romtemperatur ( $\leq 25$  °C) i opptil 28 dager.

På [felleskatalogen.no](https://felleskatalogen.no) kan du se instruksjonsfilmer for bruk av Menopur® pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning



Menopur® 600 IU



Menopur® 1200 IU