



<p>Informasjon til pasienter om OLUMIANT® (baricitinib)</p> <hr/> <p>Dette dokumentet inneholder viktig informasjon du bør være oppmerksom på før og under behandling med Olumiant.</p> <p>Ha denne informasjonen med deg og vis den til helsepersonell involvert i behandlingen din.</p> <p>Ditt navn:</p> <hr/> <p>Legens navn (forskriver av Olumiant):</p> <hr/> <p>Legens telefonnummer:</p> <hr/>	<p>Graviditet</p> <ul style="list-style-type: none">• Ta ikke Olumiant dersom du er gravid eller tror du kan være gravid.• Bruk sikker prevensjon mens du bruker Olumiant (og i 1 uke etterpå hvis du avbryter behandlingen).• Fortell legen din umiddelbart dersom du blir (eller ønsker å bli) gravid. <p>Infeksjoner</p> <p>Olumiant kan gjøre en eksisterende infeksjon verre, eller øke risikoen for at du får en ny infeksjon, eller øke risikoen for reaktivering av virusinfeksjon. Hvis du har diabetes eller er eldre enn 65 år, kan du ha økt sjanse for å få infeksjoner. Infeksjonen kan bli alvorlig hvis den ikke behandles. Informer legen din umiddelbart dersom du får symptomer på infeksjon, slik som:</p> <ul style="list-style-type: none">• Feber, sår, mer enn vanlig tretthetsfølelse eller tannproblemer.• Hoste som ikke går bort, nattesvette og vekttap. Dette kan være symptomer på tuberkulose (en infeksjonssykdom i lungene).• Smertefullt hudutslett med blemmer. Dette kan være tegn på herpes zoster infeksjon. <p>Ikke-melanom hudkreft</p> <p>Ikke-melanom hudkreft ble observert hos pasienter som tar Olumiant. Snakk med lege hvis nye hudlesjoner dukker opp under eller etter behandlingen eller hvis eksisterende lesjoner endrer utseende.</p>
--	--

	<p>Blodpropp</p> <p>Olumiant kan forårsake en tilstand hvor en blodpropp dannes i benet ditt og kan fraktes til lungene dine. Informer lege umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hevelse eller smerte i ett ben eller arm• Varme eller rødhet i ett ben eller arm• Uventet kortpustethet• Rask pust• Smerter i brystet <p><u>Hjerteinfarkt eller hjerneslag:</u></p> <p>Informér lege umiddelbart hvis du opplever noe av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alvorlige brystmerter eller tetthet (som kan spre seg til armer, kjeve, nakke, rygg)• Kortpustethet• Kaldsvette• Ensidig svakhet i arm og/eller ben• Utydelig tale
--	---

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP: www.dmp.no/pasientmelding

Se oppdatert pakningsvedlegg og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no.