



Pasientkort

Dette pasientkortet er beregnet på pasienter som behandles med nivolumab eller nivolumab i kombinasjon med ipilimumab.

For pasienter

Ha alltid med deg dette kortet for å informere helsepersonell om at du behandles med nivolumab eller nivolumab i kombinasjon med ipilimumab.



Nivolumab kan øke risikoen for alvorlige eller livstruende bivirkninger som kan påvirke ulike deler av kroppen. Hvis du får tegn eller symptomer, må du kontakte legen din **umiddelbart**. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pasientkortet eller i pakningsvedlegget med nivolumab.

MULIGE BIVIRKNINGER



Bryst (hjerte og lunger)

Pustevansker, hoste, hvesing, brystmerter, uregelmessig hjerterytme, hjertebank (økt følelse av hjerteslagene dine)



Mage (magesekk og tarm)

Diaré (vandig, løs eller bløt avføring), blod eller slim i avføringen, mørk avføring, smerte eller ømhet i magen eller mageregionen



Lever

Gulfarging av øyne eller huden (gulsott), smerter på høyre side av mageregionen



Nyrer

Endret mengde urin og/eller hyppighet av urinering



Hormonproduserende kjertler (inkludert diabetes)

Hodepine, tåkesyn eller dobbeltsyn, utmattelse (fatigue), vektendringer, endringer i oppførsel (f.eks. redusert seksualdrift, irritabilitet eller glemsomhet), overdreven tørste, økt appetitt med vekttap, svakhet, døsigheit, depresjon, generell følelse av uvelhet, endret mengde urin og/eller hyppighet av urinering



Hud

Utslett, kløe, blemmer og/eller hudavskalling (kan være dødelig), sår, tørr hud, knuter i huden



Andre

Svakhet, utmattelse (fatigue), nedsatt appetitt, kvalme, oppkast, prikking eller nummenhet i armer og bein, vanskeligheter med å gå, feber, hovne lymfeknuder, hodepine, kramper, stiv nakke, forvirring, døsigheit, muskelsmerter, stivhet, mørk urin, smerter eller rødhet i øyet, tåkesyn eller andre synsproblemer

Viktig

- Informer legen din om dine tidligere medisinske tilstander, inkludert hvis du har fått en benmargs- eller stamcelletransplantasjon fra en annen person (allogen, celletransplantasjon fra en annen person).
- Tidlig vurdering og behandling av bivirkninger av legen din reduserer risikoen for at behandling med nivolumab eller nivolumab i kombinasjon med ipilimumab må stoppes midlertidig eller permanent.
- Tegn og symptomer som kan virke milde kan raskt bli verre hvis de ikke behandles.

• **Ikke** prøv å behandle disse symptomene selv.

• Tegn og symptomer kan oppstå under behandling eller bli forsinket og oppstå uker til måneder etter siste dose.

For mer informasjon, se OPDIVO-pakningsvedlegget (www.felleskatalogen.no eller www.ema.europa.eu) eller ring Bristol Myers Squibb Medisinsk informasjon på +47 23120637.

Viktig informasjon for helsepersonell

- Denne pasienten behandles med nivolumab eller nivolumab i kombinasjon med ipilimumab.
- Immunrelaterte bivirkninger kan oppstå når som helst under behandlingen eller måneder etter avsluttet behandling.
- Tidlig diagnose og passende behandling er avgjørende for å minimere livstruende komplikasjoner.
- Konsultasjon med en onkolog eller annen medisinsk spesialist kan være nyttig for å håndtere organspesifikke immunrelaterte bivirkninger.

- For mer informasjon for helsepersonell, se OPDIVO preparatomtale (www.felleskatalogen.no, www.legemiddelsok.no eller www.ema.europa.eu) eller ring Bristol Myers Squibb Medisinsk informasjon på +47 23120637.

Leger som forskriver nivolumab eller nivolumab i kombinasjon med ipilimumab til pasienten, skal fylle ut avsnittet "Kontaktinformasjon til legen min" i dette pasientkortet.

Kontaktinformasjon til legen min (lege som foreskrev nivolumab eller nivolumab i kombinasjon med ipilimumab)

Legens navn: _____

Telefonnummer: _____

Vakttelefon: _____

Pasientens kontaktinformasjon

Pasientens navn: _____

Pasientens telefonnummer: _____

Kontaktperson i nødstilfeller (navn og telefonnummer):
