

# Paracetamol Baxter

paracetamol 10 mg/ml

INFUSJONSVÆSKE, OPPLØSNING

Kortvarig behandling av moderate smerter, spesielt etter kirurgi og for kortvarig behandling av feber, når intravenøs administrasjon er klinisk indisert ved akutt behov for å behandle smerte eller temperaturforhøyelse, og/eller når andre administrasjonsveier ikke er mulige.<sup>[1]</sup>

**DET MÅ UTVISES FORSIKTIGHET VED ADMINISTRERING AV PARACETAMOL BAXTER 10 mg/ml FOR Å UNNGÅ FORVEKSLING MELLOM MILLIGRAM (mg) og MILLILITER (ml), SOM KAN FØRE TIL UTILSIKTET OVERDOSE ELLER DØDSFALL.**

Vær nøye med å sikre at riktig dose blir ordinert og dispensert. Når ordinasjoner skrives, skal både total dose i mg og total dose i volum i ml inkluderes. Vær nøye med å sikre at dosen blir administrert riktig i henhold til de spesifikke anbefalingene for pediatrisk populasjon (se anbefalingene nedenfor).

## Administrasjonsprotokoll hos nyfødte, spedbarn og barn som veier 10 kg eller mindre<sup>[1]</sup>

[Dose uttrykt i mg/kg paracetamol]

For administrasjon hos pasienter som veier mer enn 10 kg, se preparatomtalen og Doseringsverktøyet for Paracetamol Baxter

**1 ml = 10 mg paracetamol**

Pasientens vekt	Enkelt dose	Maksimal daglig dose**
≤ 10 kg*	<b>7,5 mg/kg</b> dvs. 0,75 ml/kg	<ul style="list-style-type: none"><li>Opptil fire ganger daglig</li><li>Minimumsintervallet mellom hver administrasjon må være 4 timer</li><li>Maksimal daglig dose må ikke overskride 30 mg/kg</li></ul>
* Premature nyfødte: Det finnes ingen tilgjengelige data på sikkerhet og effekt hos premature nyfødte spedbarn.		
** Maksimal daglig dose: Den maksimale daglige dosen som er angitt i tabellen ovenfor, gjelder for pasienter som ikke får andre legemidler som inneholder paracetamol, og skal justeres deretter med hensyn til slike legemidler.		

Volumet med Paracetamol Baxter 10 mg/ml som administreres, skal aldri overskride 7,5 ml per dose hos pasienter som veier ≤10 kg.

Barnets vekt ≤10 kg	Volumet av hetteglasset som skal brukes	Tilsvarende mengde paracetamol i mg
1 kg	0,75 ml	7,5 mg
1,5 kg	1,1 ml	11 mg
2 kg	1,5 ml	15 mg
2,5 kg	1,8 ml	18 mg
3 kg	2,2 ml	22 mg
3,5 kg	2,6 ml	26 mg
4 kg	3,0 ml	30 mg
4,5 kg	3,3 ml	33 mg
5 kg	3,7 ml	37 mg
5,5 kg	4,1 ml	41 mg
6 kg	4,5 ml	45 mg
6,5 kg	4,8 ml	48 mg
7 kg	5,2 ml	52 mg
7,5 kg	5,6 ml	56 mg
8 kg	6,0 ml	60 mg
8,5 kg	6,3 ml	63 mg
9 kg	6,7 ml	67 mg
9,5 kg	7,1 ml	71 mg
10 kg	7,5 ml	75 mg

For pasienter som veier ≤10 kg, gjelder følgende anbefalinger:

- Ikke heng opp hetteglasset som en infusjonsvæske.
- Bruk en 5 eller 10ml sprøyte til å måle opp dosen som er egnet for barnets vekt og det ønskede volumet.
- Volumet som skal administreres, skal trekkes opp fra hetteglasset og kan administreres ufortynnet eller fortynt (fra én til ni volumenheter fortynningsvæske) i en 0,9 % natriumkloridoppløsning eller 5 % glukoseoppløsning og administreres på 15 minutter.
- Se preparatomtalen for mer informasjon om dosering.

Denne plakaten er en del av risikohåndteringsplanen for Paracetamol Baxter for å minimere risikoen for overdose.

Bivirkninger skal rapporteres. Rapporteringsskjemaer og informasjon finnes på [www.legemiddelverket.no/meldeskjema](http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema). Bivirkninger skal også rapporteres til Baxter på [www.baxter.no](http://www.baxter.no).

POSTER10N0

**Baxter**

[1] Preparatomtale for Paracetamol Baxter 10 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning.