

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUSJONSVÆSKE, OPPLØSNING

Kortvarig behandling av moderate smerter, spesielt etter kirurgi og for kortvarig behandling av feber, når intravenøs administrasjon er klinisk indisert ved akutt behov for å behandle smerte eller temperaturforhøyelse, og/eller når andre administrasjonsveier ikke er mulige.⁽¹⁾

DOSERINGSVERKTØY

Administrasjonsprotokoll.

Doseringstabell for Paracetamol Baxter 10 mg/ml ⁽¹⁾

Pasientens vekt	Dose per administrasjon	Volum per administrasjon	Maksimalt volum per administrasjon basert på øvre vektgrense i gruppen (ml)*	Maksimal daglig dose
≤ 10 kg	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml	30 mg/kg
>10 kg til ≤33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml	60 mg/kg, ikke over 2 g
>33 kg til ≤50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/mg	75 ml	60 mg/kg, ikke over 3 g
>50 kg med ytterligere risikofaktorer for levertoksisitet	1 g	100 ml	100 ml	3 g
>50 kg og ingen ytterligere risikofaktorer for levertoksisitet	1 g	100 ml	100 ml	4 g

1 ml = 10 mg

Pasientens vekt kg
 Volum av paracetamol ml
 Mengde av paracetamol mg

* Pasienter som veier mindre, krever mindre volumer.

Minimumsintervallet mellom hver administrasjon må være minst 4 timer. Det skal ikke gis mer enn 4 doser i løpet av 24 timer. Minimumsintervallet mellom hver administrasjon hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon må være minst 6 timer.
 (1) Preparatmåte for Paracetamol Baxter 10 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning.

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUSJONSVÆSKE, OPPLØSNING

Minimumsintervallet mellom hver administrasjon må være minst 4 timer. Det skal ikke gis mer enn 4 doser i løpet av 24 timer.

Minimumsintervallet mellom hver administrasjon hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon må være minst 6 timer.

kg – pasientens vekt

50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ml – Volum av paracetamol

75	73,5	72	70,5	69	67,5	66	64,5	63	61,5	60	58,5	57	55,5	54	52,5	51	49,5	48	46,5	45	43,5	42	40,5	39	37,5	36	34,5	33	31,5	30	28,5	27	25,5	24	22,5	21	19,5	18	16,5	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3,7	3	2,2	1,5	0,75
----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	---	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	------

mg – Mengde av paracetamol

750	720	705	675	660	645	630	615	600	585	570	555	540	525	510	495	480	465	450	435	420	405	390	375	360	345	330	315	300	285	270	255	240	225	210	195	180	165	150	135	120	105	90	75	60	45	37	30	22	15	7,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Kortvarig behandling av moderate smerter, spesielt etter kirurgi og for kortvarig behandling av feber, når intravenøs administrasjon er klinisk indisert ved akutt behov for å behandle smerte eller temperaturforhøyelse, og/eller når andre administrasjonsveier ikke er mulige.⁽¹⁾

(1) Preparatmåte for Paracetamol Baxter 10 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning.

Baxter Holding B.V.
 Kobaltweg 49, 3542CE
 Utrecht, Nederland

DOSTL10NO

Baxter

Trekk

Paracetamol Baxter

10 mg/ml

INFUSJONSVÆSKE, OPPLØSNING

For barn som veier ≤10 kg:

- Dosen hos disse pasientene er 7,5 mg/kg.
- Volumet av Paracetamol Baxter 10 mg/ml som administreres, skal aldri overskride 7,5 ml per dose hos denne vektgruppen. Mindre volumer kreves med lavere vekt.
- Hetteglasset med Paracetamol Baxter skal ikke henges opp som en infusjonsvæske på grunn av det lille volumet av legemiddel som skal administreres hos denne populasjonen.
- En 5 eller 10 ml sprøyte skal brukes til å måle opp dosen som er egnet for barnets vekt og det ønskede volumet.
- Volumet som skal administreres, skal trekkes opp fra hetteglasset og kan administreres ufortynnet eller fortynnet (fra én til ni volumenheter fortynningsvæske) i en 0,9 % natriumkloridoppløsning eller 5 % glukoseoppløsning og administreres på 15 minutter

For barn, ungdom og voksne som veier >33 kg, men ≤50 kg:

- Dosen hos disse pasientene er 15 mg/kg. Maksimal daglig dose hos disse pasientene skal ikke overstige 3 g på 24 timer.
- Volumet av Paracetamol Baxter 10 mg/ml som administreres, skal aldri overskride 75 ml per dose.

Dette verktøyet er en del av risikohåndteringsplanen for Paracetamol Baxter for å minimere risikoen for overdose.

Dato for siste revisjon av teksten: 05/2023

Se preparatomtalen for Paracetamol Baxter 10 mg/ml, infusjonsvæske, oppløsning for mer informasjon.

Baxter Holding B.V.
Kobaltweg 49, 3542DE
Utrecht, Nederland

0540372 - DOSERINGSVERKTØY BAXTER