

Paracetamol Kabi

10 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

Risiko for overdosering hos nyfødte spedbarn, spedbarn og undervektige voksne ved feildosering av paracetamol til intravenøs bruk

Indikasjon: Kortvarig behandling av moderate smerter, spesielt etter kirurgi og kortvarig behandling av feber, når intravenøs administrering er klinisk indisert ved akutt behov for å behandle smerte eller temperaturforhøyelse, og/eller når andre administrasjonsveier ikke er mulig. (1)

Doseringsintervall: Minimumsintervall ved gjentatt administrering: 4 timer, maksimalt 4 doser i løpet av 24 timer.

DOSERINGEN ANGIS I MG PARACETAMOL PR KG KROPPSVEKT OG ER FØLGELIG AVHENGIG AV PASIENTENS VEKT. VOLUMET SOM ADMINISTRERES KAN VÆRE SVÆRT LITE.

Dosering basert på pasientens vekt ⁽¹⁾

**Hetteglass 10 mg/ml
50 ml. Kun til
pasienter opp
til 33 kg.**

1 ml = 10 mg



- Pasientens vekt ≤ 10 kg
7,5 mg/kg dvs. 0,75 ml/kg.
Maksimalt 4 doser pr døgn,
maksimalt 30 mg/kg/24 timer.

- Pasientens vekt mellom 10
og 33 kg
15 mg/kg dvs 1,5 ml/kg.
Maksimalt 4 doser pr døgn,
maksimalt 60 mg/kg/24 timer.

Eksempel på dosering

Barnets vekt	Volum som skal gis
2 kg	1,5 ml
2,5 kg	1,8 ml
3 kg	2,25 ml

**Hetteglass
10 mg/ml
100 ml.
Kun til
pasienter
over 33 kg.**

1 ml = 10 mg



Pasientens vekt
mellom 33 og 50 kg
15 mg/kg dvs. 1,5 ml/kg.
Maksimalt 4 doser pr døgn,
maksimalt 60 mg/kg/24 timer.

Pasientens vekt
> 50 kg
1 g dvs 100 ml.
Maksimalt 4 doser
pr døgn,
maksimalt 4 g/24 timer.
Se preparatomtale
www.felleskatalogen.no.

- Hos barn med lav kroppsvekt kan Paracetamol Fresenius Kabi fortynnes med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml til en tidels konsentrasjon.
 - For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at det ikke gis andre legemidler som inneholder enten paracetamol eller propacetamolhydroklorid.
 - Ved overdosering skal følgende vurderes (for detaljer se preparatomtalen eller rådfør deg med en toksikolog): sykehusinnleggelse, symptomatisk behandling, administrering av N-acetylcystein (antidot), blodprøver (leverfunksjonstester, analyse av paracetamolnivået i plasma). Effekten av hemodialyse er begrenset. I alvorlige tilfeller kan levertransplantasjon være nødvendig.
- ¹⁾ Preparatomtale for Paracetamol Fresenius Kabi.

For fullstendig informasjon se preparatomtalen (SPC) som kan søkes opp på Felleskatalogen.no. Der ligger også dette materialet samt pakningsvedlegget.



**FRESENIUS
KABI**