

# Produodopa<sup>®</sup>

**(foslevodopa/foskarbidopa)**  
mot fremskreden Parkinsons sykdom

Denne pasientguiden inneholder viktig  
sikkerhetsinformasjon som du bør kjenne til.

Ha denne guiden tilgjengelig når du bruker dette legemidlet.

## Hvorfor lese denne pasientguiden?

Produodopa® er et legemiddel til behandling av symptomer ved fremskreden Parkinsons sykdom.

Det brukes når andre legemidler ikke lenger gir tilfredsstillende behandling av sykdommens symptomer.

Du eller din omsorgsperson vil administrere dette legemidlet under huden gjennom en smal plastslange (kanylen) i området rundt navlen. Dette området kalles for infusjonsstedet.

Legemidlet gis kontinuerlig gjennom denne slangen 24 timer i døgnet.

**Enkelte personer som bruker dette legemidlet kan få problemer rundt hudområdet hvor kanylen går inn i kroppen.**

**Dette kan f.eks. være:**

- **en hudinfeksjon.** Det er når bakterier kommer inn i huden.

En hudinfeksjon kan bli alvorlig dersom bakterier kommer inn i blodet og sprer seg i hele kroppen. Dette kalles sepsis.

- **en hudreaksjon.** Det er når huden blir irritert/rødflemmet.

## Denne pasientguiden vil gi deg og din omsorgsperson informasjon om:



Hvordan velge infusjonssted



Hvordan gjenkjenne en infeksjon eller reaksjon på infusjonsstedet



Hva du kan gjøre for å redusere risikoen for infeksjon eller reaksjon på infusjonsstedet



Hva du bør gjøre hvis du får en infeksjon eller reaksjon på infusjonsstedet



Hvor du kan finne mer informasjon om dette legemidlet



## Hvordan velge infusjonssted

Det er viktig å bytte infusjonssted regelmessig. Det vil gjøre at huden holder seg frisk og gjør at legemidlet blir administrert riktig.

Du kan bruke magen som infusjonssted med mindre legen sier du skal bruke et annet sted. Påse at du velger et område som er minst 5 cm unna navlen (omtrent som lengden på lillefingeren).


- Unngå beltelinjen siden det området kan være irritert av trykket av beltet mot huden
- Unngå hud med arr, hardt vev eller strekkmerker
- Unngå hudfolder eller skrukker på huden der den naturlig bøyer seg mye
- Velg et nytt infusjonssett (kanyle/slange) hver gang du bytter infusjonssted.

Bytt infusjonssted hver 3. dag eller tidligere avhengig av endringer i huden (som rødhet, hevelse og smerte).

Det nye infusjonsstedet må være minst 2,5 cm (omtrent på størrelse med to fingre) unna det siste stedet du brukte.

Når du har brukt et infusjonssted, må du ikke bruke det igjen på 12 dager. Dette vil hjelpe huden å heles fullstendig.

Det er forskjellige måter som kan hjelpe deg å huske at du ikke bruker et infusjonssted på nytt for tidlig. En måte er å late som om magen er en klokke, der du kan sette inn kanylen på ulike infusjonssteder med totimers intervaller hver gang. Du kan starte med et infusjonssted klokken 12, deretter klokken 2 etterfulgt av klokken 4 og så videre.




Noter dato og infusjonssted for å hjelpe deg med å holde oversikt.



## Hvordan gjenkjenne en infeksjon eller reaksjon på infusjonsstedet?

Se etter hudforandringer der kanylen går inn i huden. Hudforandringene kan oppstå med eller uten feber og inkluderer:

- rødhet
- huden kjennes varm ved berøring
- hevelse
- ømhet/smerte
- endringer i hudfarge når du trykker på huden





# Hva du kan gjøre for å redusere risikoen for infeksjon eller reaksjon på infusjonsstedet

Infeksjoner eller reaksjoner på infusjonsstedet kan forekomme. Nedenfor er ting du må tenke på ved klargjøring av infusjonen.



Bruk et godt opplyst område som er rent og flatt (som et bord) for å forberede infusjonen.



Sørg for at infusjonsstedet og infusjonssettet holdes rene og sterile når infusjonen forberedes.



Vask alltid hendene med såpe og vann og tørk dem med et papirhåndkle. Ikke ta på noe urent etterpå.



Unngå å la sprøytespissen, hetteglassadapteren, slangen eller koblingen berøre en uren overflate.



Vær nøye med å kaste alt brukt materiell som kan være kontaminert (ikke rent).



Når du har valgt et infusjonssted, tørk av huden med et injeksjonstørk. Pass på å tørke i én retning slik at det rengjorte området ikke blir kontaminert. La området tørke i minst 1 minutt.

**Bytt infusjonssted hver 3. dag eller før dersom du får hudforandringer (som rødhet, hevelse og smerte)**



Ved bruk av et nytt infusjonssted vent 12 dager før det samme infusjonsstedet brukes på nytt. Dette vil hjelpe huden å heles fullstendig.



Sørg alltid for at det er minst 2,5 cm (omtrent på størrelse med to fingre) unna det forrige infusjonsstedet du brukte.



Bruk alltid en ny kanyle og slange når du bytter til et nytt infusjonssted.



Fjern eventuelle hårstrå rundt infusjonsstedet med en saks. Det vil gjøre at bandasjen med kanylen lettere fester seg til huden. Hvis du må barbere huden, vent en dag før du bruker infusjonsstedet.



Bruk komfortable klær som ikke irriterer huden på infusjonsstedet.



## Hva du bør gjøre hvis du får en infeksjon eller reaksjon på infusjonsstedet

**Bytt infusjonssted – ikke vent i 3 dager.**

**Kontakt lege, sykepleier eller apotek hvis du har følgende symptomer:**

- rødhet
- huden kjennes varm ved berøring
- hevelse
- ømhet/smerte
- endringer i hudfarge når du trykker på huden

**Ikke bruk et infisert infusjonssted på nytt før etter minst 12 dager eller til huden er helet.**



## Hvor du kan finne mer informasjon om dette legemidlet

For mer informasjon om dette legemidlet, se pakningsvedlegget og bruksanvisningen som fulgte med legemidlet (foslevodopa/foskarbidopa). Dette kan søkes opp på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no).

For å melde bivirkninger av dette legemidlet kontakt legen din, sykepleier, apotek, eller meld inn på elektronisk skjema til DMP: [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding). Du kan også kontakte AbbVie ([kontakt@abbvie.com](mailto:kontakt@abbvie.com)) for å rapportere bivirkninger under bruk av dette legemidlet.