

Sikkerhetsinformasjon  I samarbeid med  
Direktoratet for  
medisinske produkter

# REBLOZYL (Iuspatercept) PASIENTKORT

---

**(For fertile kvinner)**

Pasientkort v.3  
2007-NO-2400002 juni 2024

## **Informasjon til pasienten**

REBLOZYL® (luspatercept) skal ikke brukes under graviditet eller i tre måneder før du blir gravid. REBLOZYL kan forårsake skader på det ufødte barnet.

Bruk ikke REBLOZYL dersom du er gravid eller ammer, eller dersom du kan bli gravid og ikke bruker minst én svært effektiv prevensjonsmetode.

### **Før oppstart av behandling med REBLOZYL:**

- 1.** Du må ta en graviditetstest som blir bekreftet negativ av forskrivende lege.
- 2.** Du må snakke med legen om effektive prevensjonsmetoder og bruke minst én svært effektiv prevensjonsmetode mens du tar REBLOZYL og i minst tre måneder etter at du har sluttet å ta REBLOZYL.

Graviditetstest må gjentas med passende mellomrom.

Si fra til legen umiddelbart hvis du er gravid eller tror du kan være gravid under behandling med REBLOZYL og i tre måneder etter at du har sluttet å ta REBLOZYL.

På baksiden av kortet finner du legens kontaktopplysninger. Dersom du ønsker mer informasjon om virkninger og bivirkninger av REBLOZYL, kan du lese pakningsvedlegget for REBLOZYL. Pakningsvedlegget og flere eksemplarer er tilgjengelig på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no).

Hvis du ønsker mer informasjon vennligst kontakt Bristol Myers Squibb på [medinfo.norway@bms.com](mailto:medinfo.norway@bms.com).

# Jeg har fått forskrevet REBLOZYL®

## Viktige kontaktopplysninger

Legen som har forskrevet REBLOZYL:

Navn: .....

Telefonnummer: .....

Institusjonens adresse: .....

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til Direktoratet for medisinske produkter (DMP): [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding) eller Bristol Myers Squibb medisinsk informasjon på telefon 23 12 06 37 eller e-post [medinfo.norway@bms.com](mailto:medinfo.norway@bms.com)