

Remsima

infliksimab

Pasientkort

Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i behandlingen din.

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med Remsima.

Pasientnavn:

Legens navn:

Legens telefonnummer:

Når et nytt kort tas i bruk, behold dette kortet som referanse i 4 måneder etter din siste dose med Remsima.

Vennligst les pakningsvedlegget til Remsima nøye før du starter å bruke dette legemidlet.

Dato for oppstart av Remsimabehandling:

Nåværende administrering:

Det er viktig at du og legen din noterer handelsnavnet og batchnummeret til legemidlet som blir gitt til deg.

Handelsnavn:

Batchnummer:

Be legen din notere type og dato for den/de siste undersøkelse(n) for tuberkulose (TB) under:

Test:

Test:

Dato:

Dato:

Resultat:

Resultat:

Lag deg også en liste over alle andre legemidler som du bruker og ta denne med til ethvert besøk hos lege.

Liste over allergier:

Liste over andre legemidler:

Infeksjoner

Før behandling med Remsima

- Informer legen din dersom du har en infeksjon selv om den er mindre alvorlig
- Det er veldig viktig at du informerer legen din dersom du noen gang har hatt tuberkulose (TB), eller dersom du har vært i nær kontakt med noen som har hatt TB. Legen din vil teste deg for å se om du har TB. Be legen din notere type og dato for din(e) siste undersøkelse(r) for TB på kortet
- Informer legen din dersom du har hepatitt B eller dersom du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset.

Under Remsimabehandling

- Informer legen din umiddelbart dersom du har tegn på en infeksjon. Tegnene inkluderer feber, tretthetsfølelse, (vedvarende) hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diaré, sår, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer.

Graviditet, amming og vaksiner

- Dersom du fikk Remsima da du var gravid eller dersom du ammer er det viktig at du informerer legen til barnet ditt om dette før barnet ditt får noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få en «levende vaksine», slik som BCG (brukes til å forebygge tuberkulose) før 12 måneder etter fødselen eller så lenge du ammer, med mindre ditt barns lege anbefaler noe annet.

Medfødt fruktoseintoleranse

- Remsima 100 mg og 350 mg konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder sorbitol. Hvis du har medfødt fruktoseintoleranse, skal du ikke få denne intravenøst administrerte formuleringen.
- Snakk med legen din hvis du har medfødt fruktoseintoleranse. I så fall finnes det andre egnede intravenøse infliksimabformuleringer.

Ha dette kortet med deg i 4 måneder etter din siste dose med Remsima eller ved graviditet, i 12 måneder etter fødselen av barnet ditt. Bivirkninger kan oppstå i lang tid etter din siste dose.