



FRONT

33 mm
33 mm

Danish accord

Patientkort
Accord

Rivaroxaban Accord 2,5 mg

Rivaroxaban Accord 10 mg

Rivaroxaban Accord 15 mg

Rivaroxaban Accord 20 mg

- Hav altid dette kort på dig
- Vis altid kortet til læge eller tandlæge før behandlingen

Jeg får antikoagulationsbehandling med Rivaroxaban Accord (rivaroxaban)

Navn: _____

Adresse: _____

Fødselsdato: _____

Vægt: _____

Anden medicin/andre forhold: _____

I akutte situationer, kontakt venligst:

Lægens navn: _____

Lægens telefonnummer: _____

Lægens stempel: _____

Kontakt venligst også:

Navn: _____

Telefonnummer: _____

Relation: _____

Information til sundhedspersonale:

- INR-test bør ikke anvendes, da det ikke er et pålideligt mål for Rivaroxaban Accords antikoagulerende aktivitet.

Hvad skal jeg vide om Rivaroxaban Accord?

- Rivaroxaban Accord gør blodet tyndere, hvilket forhindrer dannelse af farlige blodpropper.

Norwegian accord

Pasientkort
Accord

Rivaroxaban Accord 2,5 mg

Rivaroxaban Accord 10 mg

Rivaroxaban Accord 15 mg

Rivaroxaban Accord 20 mg

- Ha alltid dette kortet med deg.
- Vis alltid frem kortet til lege eller tannlege før du begynner på en behandling.

Jeg bruker antikoagulasjonsbehandling med Rivaroxaban Accord (rivaroksaban).

Navn: _____

Adresse: _____

Fødselsdato: _____

Vekt: _____

Andre legemidler/forhold: _____

I nødstilfelle, vennligst informer:

Legens navn: _____

Legens telefon: _____

Legens stempel: _____

Vennligst informer også:

Navn: _____

Telefon: _____

Relasjon: _____

Informasjon til helsepersonell:

- INR-verdier skal ikke brukes da de ikke er egnet til å måle antikoagulerende aktivitet for Rivaroxaban Accord.

Icelandic accord

Öryggiskort sjúklings
Accord

Rivaroxaban Accord 2,5 mg

Rivaroxaban Accord 10 mg

Rivaroxaban Accord 15 mg

Rivaroxaban Accord 20 mg

- Hafðu kortið alltaf á þér.
- Sýndu öllum læknum og tannlæknum kortið áður en meðferð er hafin.

Ég er í blóðþynningarmeðferð með Rivaroxaban Accord (rivaroxaban)

Nafn: _____

Heimilisfang: _____

Fæðingardagur: _____

Þyngd: _____

Önnur lyf / sjúkdómar: _____

I neyðartilviki skal hafa samband við:

Nafn læknis: _____

Sími læknis: _____

Stimpill læknis: _____

Einnig skal hafa samband við:

Nafn: _____

Heimilisfang: _____

Tengsl: _____

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsmenn:

- Ekki skal notast við INR gildi þar sem þau eru ekki áreiðanleg mæling á blóðþynnandi verkun Rivaroxaban Accord.

205 mm
285 mm
69 mm

Hvað þarf ég að vita um Rivaroxaban Accord?

- Rivaroxaban Accord er blóðþynnandi og ver þig fyrir myndun hættulegra blóðtappa.
- Rivaroxaban Accord verður að taka nákvæmlega eins og lækningarnir mælir fyrir um. Til þess að tryggja sem besta vörn gegn blóðtöppum skal passa að **gleyma aldrei skammti**.
- Þú mátt ekki hætta töku Rivaroxaban Accord nema ræða við lækning fyrst því hættan á blóðtöppum getur aukist.
- Láttu lækning vita um öll önnur lyf sem þú notar, hefur nýlega notað eða ætlar þér að nota, áður en þú hefur notkun Rivaroxaban Accord.
- Upplýstu lækning um að þú notar Rivaroxaban Accord áður en þú undirgengst skurðaðgerð eða aðrar aðgerðir.

Hvenær á ég að hafa samband við lækning?

- Þegar blóðþynningarlyf eins og Rivaroxaban Accord eru tekin er mikilvægt að gera sér grein fyrir hugsanlegum aukaverkunum. Algengasta aukaverkunin er blæðing. Ekki hefja töku Rivaroxaban Accord ef þú veist að þú ert í hættu á blæðingu, nema ræða það við lækning fyrst. Láttu lækning vita tafarlaust ef þú finnur fyrir einkennum blæðingar, svo sem:
 - verkjum
 - þrota eða óþægindum
 - höfuðverk, svima eða slappleika
 - óvenjulegu mari, blóðnös, tannholdsblæðingu, blæðingu frá sárum sem varir í langan tíma
 - meira tíðablóði eða blæðingu frá leggöngum en venjulega
 - blóði í þvagi sem getur verið bleikt eða brúnt, rauðum eða svörtum hægðum
 - blóði í hósta eða blóði í uppsölu eða einhverju sem líkist kaffikorgi

Hvernig á ég að taka Rivaroxaban Accord?

- Til þess að ná hámarksvernd gegn blóðtöppum, Rivaroxaban Accord
 - 2,5 mg er hægt að taka með eða án fæðu
 - 10 mg er hægt að taka með eða án fæðu
 - 15 mg verður að taka með mat
 - 20 mg verður að taka með mat

Hva þarf ég að vita um Rivaroxaban Accord?

- Rivaroxaban Accord fortynnar blóðet, noe som forhindrer at du får farlige blodpropper.
- Rivaroxaban Accord må tas nøyaktig som legen din har fortalt deg. For å sikre maksimal beskyttelse mot blodpropper må du **aldri hoppe over en dose**.
- Du må ikke slutte å ta Rivaroxaban Accord uten å snakke med legen din først, fordi det kan øke risikoen for blodpropper.
- Rådfør deg med helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, før du begynner med Rivaroxaban Accord.
- Fortell helsepersonell at du bruker Rivaroxaban Accord før kirurgiske inngrep eller andre inngrep.

Når bør jeg rådføre meg med legen min?

- Når du tar et blodfortynnede middel som Rivaroxaban Accord er det viktig å være oppmerksom på mulige bivirkninger. Blødning er den vanligste bivirkningen. Ikke begynn å ta Rivaroxaban Accord hvis du vet at du har risiko for blødninger, uten å rådføre deg med legen din først. Ta umiddelbart kontakt med legen din hvis du har noen tegn eller symptomer på blødning, som f.eks.:
 - smerte
 - hevselser eller ubehag
 - hodepine, svimmelhet eller svakhet
 - uvanlige blåmerker, neseblod, blødende tannkjøtt, kuttsår som det tar lang tid før stanser å blø
 - kraftigere menstruasjon eller vaginalblødning enn vanlig
 - blod i urinen som farger den rosa eller brun, rød eller svart avføring
 - opphostning av blod eller oppkast av blod eller oppkast som ligner på kaffegrut

Hvordan skal jeg ta Rivaroxaban Accord?

- For å sikre maksimal beskyttelse skal Rivaroxaban Accord
 - 2,5 mg kan tas med eller uten mat
 - 10 mg kan tas med eller uten mat
 - 15 mg skal tas sammen med mat
 - 20 mg skal tas sammen med mat

- Rivaroxaban Accord skal tages nøjagtigt, som lægen har ordineret. For at få en optimal beskyttelse mod blodpropper må du aldrig springe en dosis over.
- Du må ikke holde op med at tage Rivaroxaban Accord uden først at have talt med lægen, da risikoen for blodpropper kan stige.
- Informér sundhedspersonalet om evt. anden medicin, du tager lige nu, har taget for nylig, eller som du har til hensigt at begynde at tage, inden du begynder på at tage Rivaroxaban Accord.
- Informér sundhedspersonalet om, at du tager Rivaroxaban Accord, inden operation eller andre indgreb.

Hvornår skal jeg søge råd hos lægen?

- Når du tager blodfortyndende medicin som Rivaroxaban Accord, er det vigtigt at kende bivirkningerne. Blødning er den almindeligste bivirkning. Start ikke behandlingen med Rivaroxaban Accord, hvis du ved, at du har risiko for blødninger, uden først at have talt med lægen om det. Fortæl det straks til lægen, hvis du får tegn på blødning som f.eks.:
 - smerte
 - hævelse eller ubehag
 - hovedpine, svimmelhed eller svaghed
 - usædvanligt mange blå mærker, næseblod, blødning fra tandkødet, sår, hvor blødningen er lang tid om at stoppe
 - menstruation eller vaginalblødning, som er kraftigere end normalt
 - blod i urinen, der kan være rosa- eller brunfarvet, rød eller sort afføring
 - ophostning af blod eller opkastning af blod eller noget, der ligner kaffegrums.

Hvordan skal jeg tage Rivaroxaban Accord?

- For at få en optimal beskyttelse:
 - kan 2,5 mg tages med eller uden et måltid
 - kan 10 mg tages med eller uden et måltid
 - skal 15 mg tages i forbindelse med et måltid
 - skal 20 mg tages i forbindelse med et måltid.