

**PASIENTKORT****Rivaroxaban  
Medical Valley  
tabletter****2,5 mg / 10 mg  
15 mg / 20 mg**

Rivaroxaban

**PASIENTKORT**

Rivaroxaban Medical Valley 2,5 mg  
Rivaroxaban Medical Valley 10 mg  
Rivaroxaban Medical Valley 15 mg  
Rivaroxaban Medical Valley 20 mg

- Ha alltid dette kortet med deg
- Vis alltid frem kortet til lege eller tannlege før du begynner på en behandling

**Jeg bruker antikoagulasjonsbehandling  
med Rivaroxaban Medical Valley  
(rivaroksaban)**

Navn:  
Adresse:  
Fødselsdato:  
Vekt:  
Andre legemidler/forhold:

**I nødstilfelle, vennligst informer:**

Legens navn:  
Legens telefon:  
Legens stempel:

**Vennligst informer også:**

Navn:  
Telefon:  
Relasjon:

**Informasjon til helsepersonell:**

- INR-verdier skal ikke brukes da de ikke er egnet til å måle antikoagulerende aktivitet for Rivaroxaban Medical Valley.

**Hva bør jeg vite om Rivaroxaban Medical Valley?**

- Rivaroxaban Medical Valley fortynner blodet, noe som forhindrer at du får farlige blodpropper.
- Rivaroxaban Medical Valley må tas nøyaktig som legen har fortalt deg. For å sikre maksimal beskyttelse mot

blodpropper må du aldri hoppe over en dose.

- Du må ikke slutte å ta Rivaroxaban Medical Valley uten å snakke med legen først, fordi det kan øke risikoen for blodpropper.
- Snakk med helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, før du begynner med Rivaroxaban Medical Valley.
- Fortell helsepersonell at du bruker Rivaroxaban Medical Valley før alle typer operasjon eller andre inngrep.

**Når bør jeg spørre legen om råd?**

Når du tar et blodfortynnende legemiddel som Rivaroxaban Medical Valley er det viktig å være oppmerksom på mulige bivirkninger. Blødning er den vanligste bivirkningen. Ikke begynn å ta Rivaroxaban Medical Valley hvis du vet at du har risiko for blødninger, uten å snakke med legen først. Ta umiddelbart kontakt med lege hvis du har noen tegn eller symptomer på blødning, som f.eks.:

- smerter
- hevelser eller ubehag
- hodepine, svimmelhet eller svakhet
- uvanlige blåmerker, neseblod, blødende tannkjøtt, kuttsår som det tar lang tid før stanser å blø
- kraftigere menstruasjon eller vaginalblødning enn vanlig
- blod i urinen som farger den rosa eller brun, rød eller svart avføring
- opphosting av blod eller oppkast av blod eller oppkast som ligner på kaffegrut

**Hvordan skal jeg ta Rivaroxaban Medical Valley?**

- For å sikre maksimal beskyttelse skal Rivaroxaban Medical Valley
  - 2,5 mg tas med eller uten mat
  - 10 mg tas med eller uten mat
  - 15 mg skal tas sammen med mat
  - 20 mg skal tas sammen med mat