

Legens stempel:

Legens telefon:

Legens navn:

I nødstilfelle, vennligst informer:

Andre legemidler/forhold:

Fødselsdato: Vekt:

Adresse:

Navn:

RIVAROXABAN ZENTIVA PASIENTKORT

- Ha alltid dette kortet med deg.
- Vis alltid frem kortet til lege eller tannlege før du begynner på en behandling.

Eventuelle bivirkninger rapporteres til PV-Norway@zentiva.com.

Hva bør jeg vite om Rivaroxaban Zentiva?

- Rivaroxaban Zentiva fortynner blodet, noe som forhindrer at du får farlige blodpropper.
- Rivaroxaban Zentiva må tas nøyaktig som legen din har fortalt deg. For å sikre maksimal beskyttelse mot blodpropper må du **aldri hoppe over en dose**.
- Du må ikke slutte å ta Rivaroxaban Zentiva uten å snakke med legen din først, fordi det kan øke risikoen for blodpropper.
- Rådfør deg med helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, før du begynner med Rivaroxaban Zentiva.
- Fortell helsepersonell at du bruker Rivaroxaban Zentiva før kirurgiske inngrep eller andre inngrep.

Når bør jeg rådføre meg med legen min?

Når du tar et blodfortynnende middel som Xarelto er det viktig å være oppmerksom på mulige bivirkninger. Blødning er den vanligste bivirkningen. Ikke begynn å ta Xarelto hvis du vet at du har risiko for blødninger, uten å rådføre deg med legen din først. Ta umiddelbart kontakt med legen din hvis du har noen tegn eller symptomer på blødning, som f.eks.:

- Smerte
- Hevelse eller ubehag
- Hodepine, svimmelhet eller svakhet
- Uvanlige blåmerker, neseblod, blødende tannkjøtt, kuttsår som det tar lang tid før stanser å blø
- Kraftigere menstruasjon eller vaginalblødning enn vanlig
- Blod i urinen som farger den rosa eller brun, rød eller svart avføring
- Opphosting av blod eller oppkast av blod eller oppkast som ligner på kaffegrut

Hvordan skal jeg ta Rivaroxaban Zentiva?

For å sikre maksimal beskyttelse skal Rivaroxaban Zentiva:

- 2,5 mg tas med eller uten mat
- 10 mg skal tas med eller uten mat
- 15 mg skal tas sammen med mat
- 20 mg skal tas sammen med mat

Informasjon til helsepersonell:

INR-verdier skal ikke brukes da de ikke er egnet til å måle antikoagulerende aktivitet for Rivaroxaban Zentiva.