

INNHold PÅ PASIENTKORT

PASIENTKORT – AKUTT MYELOGEN LEUKEMI

Tibsovo 250 mg filmdrasjerte tabletter ivosidenib

Informasjon til pasient som behandles for akutt myelogen leukemi

Dette pasientkortet inneholder viktig informasjon om Tibsovo til deg og helsepersonell.

- Ha alltid dette kortet med deg.
- Si fra til alle leger, farmasøyter eller sykepleiere at du tar Tibsovo.
- Ta kontakt med helsepersonell med én gang og vis dette kortet hvis du får noen av symptomene på listen nedenfor.
- Pass på at du bruker den nyeste versjonen av kortet. Det betyr kortet som fulgte med den siste esken med tabletter.

Om behandlingen

- Tibsovo brukes til å behandle voksne med akutt myelogen leukemi (AML) og gis i kombinasjon med en annen kreftmedisin kalt «azacitidin». Tibsovo brukes kun til pasienter med AML som har en endring (mutasjon) i IDH1-proteinet.
- Tibsovo kan forårsake **alvorlige bivirkninger**, inkludert en alvorlig tilstand kalt **differensieringssyndrom**.
- Differensieringssyndrom kan være livstruende hvis det ikke behandles.
- Differensieringssyndrom hos pasienter med AML har oppstått opptil 46 dager etter behandlingsstart.

Oppsøk lege straks hvis du får noen av følgende **symptomer** på differensieringssyndrom:

- feber
- hoste
- pusteproblemer
- utslett
- redusert vannlating
- svimmelhet eller ørhet
- rask vektøkning
- hevelse i armer eller ben

Se pakningsvedlegget til Tibsovo for mer informasjon.

Informasjon til helsepersonell

- Pasienter behandlet med Tibsovo har fått differensieringssyndrom, som kan være livstruende eller fatalt dersom det ikke behandles.
- Differensieringssyndrom hos pasienter med AML har oppstått opptil 46 dager etter behandlingsstart.
- Differensieringssyndrom er assosiert med rask proliferasjon og differensiering av myeloide celler. Symptomer omfatter:

ikke-infeksiøs leukocytose, perifert ødem, pyreksi, dyspne, pleuraeffusjon, hypotensjon, hypoksi, lungeødem, pneumonitt, perikardeffusjon, utslett, væskeoverbelastning, tumorlysesyndrom og økt kreatinin.

- Ved mistanke om differensieringssyndrom, administrer systemiske kortikosteroider og start hemodynamisk monitorering inntil symptomopphør og i minimum 3 dager.

Se preparatomtalen til Tibsovo for mer informasjon.

Denne delen må fylles ut

Pasientens navn: _____

Fødselsdato: _____

Startdato og dose for Tibsovo: _____

Forskriver/nødkontakt på sykehus: _____