

Informasjon vedrørende medikamentelt svangerskapsavbrudd

Pasientmateriell (inkludert Pasientkort)

Du har valgt å avbryte svangerskapet med et legemiddel (medikamentelt svangerskapsavbrudd). Dette heftet vil gi deg informasjon om de ulike trinn i behandlingen og påpeke viktige spørsmål du bør vurdere. Du finner mer informasjon om Topogyne® i pakningsvedlegget.

Før medikamentelt svangerskapsavbrudd settes i gang:

- Les pakningsvedlegget for mifepriston og misoprostol
- Informer legen din om følgende:
 - hvis du har lever- eller nyresykdom
 - hvis du lider av blodmangel (anemi) eller feilernæring
 - hvis du har hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom)
 - hvis du har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Risikofaktorer er alder over 35 år og røyking eller høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå eller sukkersyke (diabetes)
 - hvis du tidligere har fått utført keisersnitt eller kirurgi i livmoren

Dersom du føler deg uvel, er bekymret eller har ytterligere spørsmål, ta kontakt med legen din. Pasientkort er tilgjengelig (se nedenfor), der legen har notert relevant kontaktinformasjon og hvor du kan henvende deg ved behov for øyeblikkelig hjelp.

■ DENNE TYPE SVANGERSKAPSAVBRUDD UTFØRES SLIK:

36 – til 48 timer etter at du har tatt 600 mg Mifegyne® (3 tabletter) gjennom munnen tar du 400 µg Topogyne® (1 tablett) gjennom munnen.

□ □ / □ □ / □ □ □ □
D D M M Å Å Å Å

2-3 uker etter inntak av det første legemidlet (Mifegyne®), må du møte på en obligatorisk oppfølgingstime. Denne timen er viktig fordi legen vil kontrollere at utdrivelsen (aborten) er fullstendig og forsikre seg om at du ellers er ok.

□ □ / □ □ / □ □ □ □
D D M M Å Å Å Å

■ DETTE KAN DU OPPLIVE VED SVANGERSKAPSAVBRUDD:

- Medikamentelt svangerskapsavbrudd fører til sammentrekninger av livmoren. Du kan oppleve smerte, tretthet, kvalme, oppkast og diaré, så du

bør slappe av og ha noen hos deg. Bruk gjerne smertestillende som legen har forskrevet.

- Blødning ved svangerskapsavbrudd er ofte kraftigere enn ved menstruasjonsblødning, kan inneholde blodklumper og geleaktig hvite klumper kan noen ganger være synlige. Blødning kan oppstå kort tid etter inntak av Topogyne®, eller kan inntreffe senere.
 - Embryoet kan utdrives i løpet av få timer etter inntak av Topogyne® eller i løpet av få dager.
 - Blødning varer gjennomsnittlig i 12 dager eller mer etter inntak av Mifegyne® og er vanligvis mindre enn ved vanlig menstruasjonsblødning. **Blødning betyr ikke nødvendigvis at utdrivelsen (aborten) er fullstendig.**
- Etter svangerskapsavbrudd gjenopprettes fruktbarheten umiddelbart. **Du bør rådføre deg med lege angående hvilken prevensjonsmetode som passer best for deg og du bør starte å bruke prevensjon samme dag som svangerskapsavbruddet er bekreftet.**

■ KONTAKT LEGE UMIDDELBART DERSOM:

- Du **kaster opp** innen 30 minutter etter inntak av Topogyne®. Legen vil da bestemme om det er nødvendig med en ny dose av legemidlet.
- Du har **unormal blødning** med hensyn på varighet og mengden blod (mer enn 12 dager og/eller du bruker mer enn 2 bind i timen i 2 timer).
- Du har kraftige **magesmerter**, selv om du bruker smertestillende
- Du har **feber** eller du fryser og skjelver.

På oppfølgingstimen vil legen kontrollere at utdrivelsen (aborten) er fullstendig. Dersom svangerskapsavbruddet er mislykket, kan risiko for fosteret ikke utelukkes. Du bør ta dette i betraktning før du bestemmer deg for om du skal fortsette svangerskapet til termin eller ikke:

- Dersom du fortsatt vil gjennomføre svangerskapsavbruddet, vil en annen metode bli benyttet. Legen vil gi deg råd om alternativene.
- Dersom du bestemmer deg for å fortsette svangerskapet til termin, må du følges opp under svangerskapet med nøye overvåking av fosteret og gjentatte ultralydundersøkelser gjennomføres av spesialist.

Topogyne® (misoprostol)

PASIENTKORT

HVIS DU PÅ NOE TIDSPUNKT er bekymret eller dersom følgende oppstår:

- **feber** som varer i mer enn 24 timer
- **smerte** som fortsetter til tross for bruk av smertestillende
- betydelig og fortsatt **blodtap** (bruker mer enn 2 bind i timen i 2 timer)
- **kraftløshet, eller dersom du har spørsmål**

Kontakt legen din eller oppsøk behandlingsstedet:

Lege eller spesialistklinikk





Oppfølgingstime på klinikken

/ / på

D D M M Å Å Å Å

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til Legemiddelverket: www.legemiddelverket.no/pasientmelding.
Se oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmaterieill på www.felleskatalogen.no.

Nordic Drugs AB
www.nordicdrugs.no
Drug safety Nordic Drugs
E-post: safety@nordicdrugs.se

Version 1 March 2022

