

Informasjon om dosering i forbindelse med introduksjon av ny insulinpenn DoubleStar™

TOUJEO® (INSULIN GLARGIN 300 ENHETER/ML)

Toujeo® 300 enheter/ml SoloStar®, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn - én
enhet pr dosetrinn



Toujeo® 300 enheter/ml DoubleStar™, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn – to
enheter pr dosetrinn

VEILEDNING FOR HELSEPERSONELL

- Dette er kun en veiledning for å unngå doseringsfeil. Helsepersonell henvises til preparatomtalen for Toujeo® før forskrivning og utlevering.
- Ved forskrivning og utlevering av Toujeo® for første gang eller ved bytte til ny penn, vennligst anbefal pasienten å lese pakningsvedlegget for å sikre at pasienten og deres pårørende er tilstrekkelig informert om bruk av Toujeo® for å redusere risiko for medisineringsfeil.

Viktig sikkerhetsinformasjon om dosejustering de første ukene ved forskrivning av Toujeo®

- Insulin glargin 100 enheter/ml og Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) er ikke bioekvivalente og derfor ikke byttbare uten dosejustering.
- Dosejustering kan være nødvendig når man bytter fra den ene til den andre styrken.
- Toujeo® doseringsregime (dosering og tidspunkt) bør justeres i henhold til individuell respons på behandling. Etter titrering er det nødvendig med gjennomsnittlig 10-18 % høyere dose av basalinsulin for å nå målområdet for plasmaglukosenivåer når man bruker 300 enheter/ml sammenlignet med 100 enheter/ml.
- Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) er tilgjengelig i to forskjellige presentasjoner:



Dosetrinnene av Toujeo® SoloStar® er én enhet.

Dosetrinnene av Toujeo® DoubleStar™ er 2 enheter.

Minste dose med den nye Toujeo DoubleStar er 2 enheter.

Dosen som gis er den som vises i doseringsvinduet.

Omstilling fra andre basalinsuliner til Toujeo®

- Når man omstilles fra et behandlingsregime med middels- eller langtidsvirkende insulin til et regime med Toujeo® 300 enheter/ml, kan det være nødvendig å endre dosen basalinsulin og justere samtidig antihyperglykemisk behandling. Det anbefales tett metabolsk kontroll under omstillingen og i ukene etterpå.
- **Omstilling fra basalinsulin som doseres én gang daglig til Toujeo® én gang daglig** kan gjøres enhet for enhet basert på den tidligere dosen med basalinsulin.
- **Ved omstilling fra basalinsulin som doseres to ganger daglig til Toujeo® én gang daglig**, er anbefalt startdose for Toujeo® 80 % av total daglig dose for det tidligere basalinsulinet.
- Pasienter skal overvåke blodsukkeret under omstillingen og i ukene etterpå.

Omstilling fra Toujeo® til andre basalinsuliner

- Omstilling fra Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) til Lantus® (insulin glargin 100 enheter/ml) fører til økt risiko for hypoglykemi, hovedsakelig i den første uken etter omstilling.
- Ved omstilling fra Toujeo® til Lantus® reduseres dosen (ca. 20 %) for å redusere risikoen for hypoglykemi.

Se preparatomtalen til Toujeo® for utfyllende anbefalinger

Gi pasientene dine et pasientkort med beskjed om å lese dette. Gi også pasientene beskjed om å lese pakningsvedlegget nøye.

Preparatomtale, pakningsvedlegget og informasjonsmaterialet for pasient kan søkes opp på www.Felleskatalogen.no

Be pasientene om å ta med seg pasientkortet når de går på apoteket.

Bivirkningsrapportering: Ved feilbruk eller mistanke om bivirkninger oppfordres helsepersonell å melde mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: www.dmp.no/meldeskjema

Du kan også kontakte Sanofi på medinfo-norge@sanofi.com eller på tlf. nr: 46 91 80 01 (10-14).