



Toujeo®

(insulin glargin 300 enheter/ml)

PASIENTKORT

Dersom du forskrives Toujeo® må du først få opplæring i bruk av insulinpennen Toujeo® SoloStar®. Du må også lese hele pakningsvedlegget som følger med insulinpennen. Dette pasientkortet er kun en forenklet veiledning.

- ✓ Ta vare på dette kortet. Du kan få behov for å lese det på nytt.
- ✓ Skriv ned navnet ditt her:

- ✓ Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
- ✓ **Du må ikke gjøre egne omregninger av dosen. Bruk antall enheter insulin som er forskrevet av legen.**

Insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®) og insulin glargin 100 enheter/ml (Lantus®) er ikke identiske (ikke bioekvivalente) og derfor ikke byttbare uten dosejustering.

Bytte fra en type insulin til en annen skal bare gjøres når det er forskrevet av lege. Den nye doseringsanbefalingen fra legen skal alltid følges.

Blodsukkeret ditt må måles hyppig under byttet og de første ukene etterpå.

Vennligst kontakt helsepersonell for mer informasjon.

Før du injiserer Toujeo®

- ✓ Les pakningsvedlegget
- ✗ Dersom du ikke følger instruksjonene i pakningsvedlegget kan du komme til å injisere for mye eller for lite insulin.

Dersom du får bivirkninger, ta kontakt med lege eller apotek. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er oppgitt i pakningsvedlegget. Bivirkninger kan også rapporteres direkte til Direktoratet for medisinske produkter via meldeskjema som finnes på nettsiden www.dmp.no/meldeskjema. Du kan også kontakte produsenten Sanofi på epost: medinfo-norge@sanofi.com eller telefon 469 18 001 (10-14).