

# PASIENTKORT

## ▼ UPLIZNA® (inebilizumab)

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se siste side for informasjon om bivirkningsrapportering.

Dette pasientkortet oppfyller vilkårene for markedsføringstillatelsen.

EU versjon 3.0 / Feb. 2026

Helsepersonell

Pasientens navn

som får UPLIZNA

## Ha alltid med deg dette kortet.

Ikke alle mulige bivirkninger er oppført på dette pasientkortet. Les pakningsvedlegget for komplett informasjon om kjente bivirkninger. Du kan også søke etter pakningsvedlegg via følgende lenke:  
[www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/](http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/).

## UPLIZNA KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Vær oppmerksom på tegn og symptomer for å oppdage infeksjoner tidlig:

- infeksjoner, inkludert alvorlige infeksjoner
- reaktivering av virus
- opportunistiske infeksjoner
- progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

## VIKTIGE MULIGE BIVIRKNINGER AV UPLIZNA

### **Infeksjonsrisikoen er forhøyet.**

Alvorlige eller uvanlige infeksjoner kan forekomme.

**Si fra til legen** hvis du opplever symptomer på en infeksjon, for eksempel:

- tett eller rennende nese
- sår hals eller hoste
- røde, smertefulle blemmer på huden
- smertefull og hyppig vannlating
- kortpustethet
- brennende følelse, nummenhet eller prikking
- søvnighet
- verking i kroppen
- feber eller frysninger
- stikkende smerter

**Virusinfeksjoner du har hatt tidligere, kan bli reaktivert.**

Dette kan skje hvis immunsystemet svekkes. Ett eksempel på en alvorlig infeksjon er hepatitt, en leverinfeksjon. Før hver behandling blir det tatt en hepatitt-test. Si fra til legen umiddelbart hvis du har symptomer på infeksjon.

**Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)**

er en sjelden infeksjon i hjernen. PML kan føre til død eller alvorlig funksjonsnedsettelse. Den kan starte med milde symptomer. Den kan imidlertid bli verre i løpet av noen dager eller uker.

**Symptomene på PML er:**

- svakhet på den ene siden av kroppen
- synsforstyrrelser
- forvirring
- tunge armer og bein
- endringer i tenkemåte, hukommelse eller personlighet
- nylige krampeanfall

**Oppsøk legehjelp umiddelbart hvis du får noen av disse symptomene.**

For å få flere eksemplarer av pakningsvedlegget, kontakt Amgens avdeling for medisinsk informasjon på tlf. +47 23 30 80 00 eller via e post til: [medinfo.norway@amgen.com](mailto:medinfo.norway@amgen.com)

Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger.

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning direkte via [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding).

**Kontakt legen** hvis du får symptomer på infeksjon eller PML:

Navn

Telefonnummer

Legesenter