



Pasientkort – advarsel om graviditet

▼ Velsipity (etrasimod)

▼ Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning: www.dmp.no/pasientmelding

Etrasimod kan skade fosteret hvis det brukes under graviditet. Det er en potensiell risiko for spontanabort og misdannelser hos fosteret.

Du skal ikke bruke etrasimod dersom du er gravid eller ammer, planlegger å bli gravid eller dersom du kan bli gravid og ikke bruker sikker prevensjon. Si fra til lege eller sykepleier umiddelbart dersom noe av dette gjelder deg.

Viktig informasjon:

- Du må ha en negativ graviditetstest før oppstart av behandling, og du bør også ta jevnlige graviditetstester under behandlingen.
- Du må bruke sikker prevensjon mens du tar etrasimod, og i minst 14 dager etter at du har avsluttet behandlingen. Legen vil gi råd om riktig prevensjon for deg.

Si fra til legen umiddelbart dersom du likevel blir gravid under behandling med etrasimod, eller innenfor 14 dager etter at behandlingen ble avsluttet.

Behandling med etrasimod skal avsluttes ved graviditet. Legen vil snakke med deg om risiko for fosterskade og kan gjøre flere undersøkelser, bl.a. ultralyd.

Ha dette kortet med deg og vis det til helsepersonell som er involvert i din medisinske behandling.

- Dersom du slutter å bruke etrasimod må du ha dette kortet med deg i minst 2 måneder etter at du har tatt siste dose.

Se pakningsvedlegget i pakningen, eller se www.felleskatalogen.no for mer informasjon

Annen informasjon (vennligst fyll ut):

Pasientens navn:

Legens navn:

Legens telefon:

Dette pasientkortet er også tilgjengelig på www.felleskatalogen.no