

Viktig kontaktinformasjon

Mitt navn:

Kontaktperson ved nødstilfelle (navn og telefonnummer):

Legens navn - som forskrev Venclyxto:

Legens telefonnummer:

Sikkerhetsinformasjon



Etter krav fra
Direktoratet for
medisinske produkter

abbvie



Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell vedrørende Venclyxto® og TLS

Denne pasienten tar Venclyxto® for KLL, noe som kan føre til tumorlysesyndrom (TLS) i løpet av de 5 første ukene av behandlingen.

- Vurder blodkjemi: kalium, urinsyre, fosfat, kalsium og kreatinin.
- Eventuelle avvik i blodkjemi skal raskt korrigeres.
Ubehandlet kan tilstanden være livstruende.
- Ved mistanke om TLS, kontakt forskrivende lege som er oppført på dette kortet umiddelbart.

Vennligst se preparatomtalen eller kontakt AbbVie på tel. +4767818000 for mer informasjon og dersom du trenger flere pasientkort.

Pasientkort

Sikkerhetsinformasjon - Venclyxto® (venetoklaks) for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Venclyxto brukes til å behandle pasienter med KLL. Dette kortet inneholder informasjon som du trenger å vite vedrørende tumorlysesyndrom og Venclyxto®.



- Ha alltid dette kortet med deg.
- Vis kortet til alle leger som involveres i din medisinske behandling eller til legevakten om du må dit.
- Ta alltid Venclyxto® nøyaktig som forskrevet av legen din.

Hva bør jeg vite om TLS?

Under behandlingen kan du utvikle forhøyede nivåer av noen kroppssalter i blodet (slik som kalium og urinsyre). Dette kan føre til en tilstand kalt tumorlysesyndrom (TLS) iløpet av de første 5 ukene av behandlingen.

Symptomer på TLS:

- feber eller frysninger
- kvalme eller oppkast
- føler deg forvirret
- føler deg kortpustet
- uregelmessige hjerteslag
- mørk eller uklar urin
- uvanlig trøtthet
- muskelsmerter eller vonde ledd
- krampeanfall eller kramper
- magesmerter og oppblåsthet

Hva bør du gjøre hvis du opplever symptomer på TLS?

Hvis du opplever symptomer på TLS under behandlingen, må du:

- ⚠ **Ring legen din umiddelbart, eller oppsøke øyeblikkelig medisinsk hjelp**
- ⚠ **Slutte å ta Venclyxto®**

Les pakningsvedlegget for mer informasjon.
Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP:
www.dmp.no/pasientmelding

Hvordan kan jeg redusere risikoen for å få TLS?



Drikk minst 1,5 til 2 liter vann daglig:

- start 2 dager før din første dose, og
- på den dagen du tar første dose, og
- hver dag i løpet av de første 5 ukene av behandlingen. Å drikke mye vann bidrar til å fjerne forhøyede nivåer av blodsalter via urinen.



Møt opp til planlagte avtaler for blodprøvetaking, da det vil hjelpe legen å oppdage TLS.



Før du starter behandling med Venclyxto®, vil legen gi deg et annet legemiddel som du skal starte å bruke for å forebygge opphopning av urinsyre i kroppen.