

Hva bør jeg vite om Xarelto?

- ◆ Xarelto fortynner blodet, noe som forhindrer at farlige blodpropper oppstår.
- ◆ Xarelto må tas nøyaktig som legen har fortalt deg. For å sikre maksimal beskyttelse mot blodpropper må du **aldri hoppe over en dose**.
- ◆ Du må ikke slutte å gi/ta Xarelto uten å snakke med legen først, fordi det kan øke risikoen for blodpropper.

- ◆ Fortell helsepersonell dersom barnet/du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, før du begynner med Xarelto.
- ◆ Fortell helsepersonell at barnet/du bruker Xarelto før kirurgiske inngrep eller andre inngrep.

Når bør jeg rådføre meg med helsepersonell?

Når du tar et blodfortynnende middel som Xarelto er det viktig å være oppmerksom på mulige bivirkninger. Blødning er den vanligste bivirkningen.

Ikke begynn å gi Xarelto til barnet/ta Xarelto hvis du vet at barnet/du har risiko for blødninger, uten å rådføre deg med legen først. Ta umiddelbart kontakt med helsepersonell hvis barnet/du har noen tegn eller symptomer på blødning, som f.eks.:

- ◆ smerte
- ◆ hevelser eller ubehag
- ◆ hodepine, svimmelhet eller svakhet
- ◆ uvanlige blåmerker, neseblod, blødende tannkjøtt, kuttsår som det tar lang tid før stanser å blø
- ◆ kraftigere menstruasjon eller vaginalblødning enn vanlig

- ◆ blod i urinen som farger den rosa eller brun, rød eller svart avføring
- ◆ opphosting av blod eller oppkast av blod eller oppkast som ligner på kaffegrut

Hvordan skal jeg gi Xarelto til barnet/Hvordan skal jeg ta Xarelto?

- ◆ For å sikre maksimal beskyttelse skal Xarelto 1 mg/ml gis/tas under mating (amming eller morsmelkerstatning) eller sammen med et måltid.
- Det kan gis gjennom en nasogastrisk sonde eller magesonde.

88034481 NO



Pasientkort
Xarelto® 1 mg/ml
granulat til mikstur,
suspensjon

Informasjon til omsorgspersoner/pasienter:

- ◆ Ha alltid dette kortet med deg.
- ◆ Vis alltid frem kortet til lege eller tannlege før behandling av pasienten skal starte opp.

Se opplæringsvideoen som viser hvordan du skal tilberede og administrere miksturen.



go.bayer.com/junior

Pasienten som er under antikoagulasjonsbehandling med Xarelto (rivaroksaban)

Navn: _____	Andre legemidler/forhold: _____
Adresse: _____	_____
_____	_____
_____	_____
Fødselsdato: _____	Vekt: _____
_____	_____

I nødstilfelle, vennligst informer:

Legens navn: _____
Legens telefon: _____
Legens stempel: _____

Vennligst informer også:

Navn: _____
Telefon: _____
Relasjon: _____

Informasjon til helsepersonell:

- ◆ INR-verdier skal ikke brukes da de ikke er egnet til å måle antikoagulerende aktivitet for Xarelto.

