


Pasientkort

Dette pasientkortet oppfyller vilkårene for markedsføringstillatelsen

Versjon 7, 731-NO-2500001, mai 2025



Viktig informasjon for pasienter

Ha alltid med deg dette kortet for å informere helsepersonell om at du får behandling med ipilimumab alene.



Hvis du har noen tegn eller symptomer, gi beskjed til legen umiddelbart.

Mulige Bivirkninger



Mage og tarm

Diaré (vandig, løs eller bløt avføring), blod i avføringen eller mørkere avføring, økning i antall avføringer, smerte eller ømhet i magen eller mageregionen, kvalme, oppkast



Øye

Rødhet i øyet, øyesmerter, synsforandringer eller tåkesyn



Hormonkjertler

Rask hjerterytme, økt svetting, vektendring, frysninger, hårtap, forstoppelse, dypere stemme, feber, tretthetsfølelse, hodepine, svimmelhet eller besvimelse, kraftig sult og/eller tørste, endring i mengde og/eller hyppighet av urin, eller atferdsendringer (som redusert sexlyst, irritabilitet eller glemsomhet)



Lever

Gulfarging av øyne eller hud (gulsott), smerter på høyre side av mageregionen, mørk urin eller blødning



Lungene

Kortpustethet, hoste eller brystmerter



Nerver

Muskelsvakhet, nummenhet eller kribling i bein, armer eller ansikt, svimmelhet, tap av bevissthet eller problemer med å våkne



Hud

Hudutslett med eller uten kløe, tørr hud, blemmer og/eller hudavskalling, munnsår, hovent ansikt eller hovne lymfeknuter

Andre viktige bivirkninger:

Alvorlige infusjonsreaksjoner:

- Reaksjoner på infusjon av ipilimumab i blodomløpet kan oppstå, normalt i løpet av eller innen 24 timer etter mottatt dose.
- Snakk med lege eller sykepleier med det samme dersom du får noen av disse symptomene under infusjon med ipilimumab: frysninger eller skjelving, kløe eller utslett, rødme, vanskeligheter med å puste, svimmelhet, feber eller følelse av å besvime.

VIKTIG

- Fortell legen din om alle tidligere sykdommer.
- Tidlig behandling av bivirkninger reduserer sannsynligheten for at behandlingen med ipilimumab må stoppes midlertidig eller permanent.
- Milde tegn og symptomer kan raskt forverres hvis de ikke behandles.
- **IKKE** forsøk å behandle disse symptomene på egenhånd.
- Tegn og symptomer kan være forsinket og kan oppstå uker eller måneder etter din siste ipilimumab injeksjon.

For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget for ipilimumab på www.felleskatalogen.no eller kontakt Medisinsk Informasjon på 23 12 06 37.

VIKTIG informasjon til helsepersonell

- Denne pasienten er under behandling med ipilimumab monoterapi.
- Immunrelaterte bivirkninger kan oppstå under behandling eller måneder etter avsluttet behandling.
- Tidlig diagnose og hensiktsmessig håndtering er avgjørende for å minimere livstruende komplikasjoner.
- Konsultasjon med en onkolog eller en annen spesialist kan være til hjelp ved organ-spesifikke immunrelaterte bivirkninger.
- Helsepersonell, se godkjent preparatomtale (SPC) for ipilimumab på www.felleskatalogen.no eller kontakt Medisinsk informasjon på 23 12 06 37 for ytterligere informasjon.

Helsepersonell som behandler denne pasienten med ipilimumab skal fylle ut "Kontaktinformasjon til min lege" i dette pasientkortet.

Kontaktinformasjon til min lege

(som har forskrevet ipilimumab)

Legens navn:

Telefonnummer i arbeidstiden:

Telefonnummer utenfor arbeidstiden:

Min kontaktinformasjon

Mitt navn og telefonnummer:

Navn og telefonnummer på omsorgsperson (i nødstilfelle):
.....