

Viktig sikkerhetsinformasjon du må være oppmerksom på før og under behandling med injeksjoner med Zoledó for kreftrelaterte tilstander.

- Legen din har anbefalt at du får injeksjoner med Zoledó for å forhindre benkomplikasjoner (f.eks. brudd) forårsaket av skjelettmetastaser eller benkreft og å redusere mengden kalsium i blodet hos voksne pasienter når det er for høyt på grunn av en svulst. Svulster kan påvirke normal benomsetning på en slik måte at større mengder kalsium frigis fra ben. Denne tilstanden kalles tumorindusert hyperkalsemi (TIH).

En bivirkning som kalles osteonekrose i kjeven (benskader i kjeven) er rapportert mindre vanlig (1 av 100 personer) hos pasienter som får injeksjoner med Zoledó

accord

for kreftrelaterte tilstander. Osteonekrose i kjeven kan også oppstå etter at behandlingen er avsluttet.

Det er noen forholdsregler du bør ta for å redusere risikoen for å utvikle osteonekrose i kjeven:

Før du starter behandlingen:

- Be legen din fortelle deg om osteonekrose i kjeven før du begynner behandlingen.
- Spør legen din om en tannsjekk er anbefalt før du begynner behandlingen med Zoledó.
- Fortell legen/sykepleieren din (helsepersonell) dersom du har noen problemer med munnen din eller tennene dine.

Du kan ha høyere risiko for osteonekrose i kjeven dersom du:

- gjennomgår tannkirurgi (f.eks. tanntrekking)
- ikke går regelmessig til tannlege
- har en tannkjøttsykdom
- er røyker
- får ulike typer kreftbehandlinger
- er tidligere behandlet med et bisfosfonat (brukes til å behandle eller forebygge benlidelser)

Mens du blir behandlet:

- Du bør opprettholde god munnhygiene, sørge for at tannprotesen passer ordentlig og få tannsjekk regelmessig.
- Informer legen din og tannlegen din at du er under behandling med Zoledo dersom du er i gang med en tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. tanntrekking).
- Kontakt lege og tannlege umiddelbart dersom du opplever problemer med munnen din eller tennene dine, som for eksempel løse tenner, smerter eller hevelse, sår som ikke gror eller avgir puss (væsker), da dette kan være tegn på osteonekrose i kjeven.

Les pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

Rapportering av bivirkninger

Du kan bidra ved å melde eventuelle bivirkninger du eventuelt får. Hvis du opplever bivirkninger, snakk med lege, apotek eller sykepleier. Dette gjelder også mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP:
www.dmp.no/pasientmelding.

Du kan også melde bivirkninger direkte til Accord på +46 8 624 00 25 eller medinfo_nordic@accord-healthcare.com

Ved å melde bivirkninger kan du bidra til å gi mer informasjon om sikkerheten til Zoledo.